

- התקינו את הסידורים הנ"ל ומייבשים כרגיל בשדה.
- שאלה 6. — מהי התערובת של המזון המרוכז כשבמשק מצויה שחת משובחת?
- ת. — רובם מסתפקים בתערובת המצטרפת מתירס, ש"ש, שעורה וסובין, והמעטים שמוסיפים גם כוסבות מצמצמים את מכסתה ל-10—15 אחוז לכל היותר. שלושה מבין המשתתפים קונים תערובת מסחרית מוכנה המכילה כ-14—16 אחוז חלבון כללי.
- שאלה 7. — כיצד משנים את התערובת כשהשחת היא מטיב גרוע?
- ת. — אחדים מגדילים את מנת המזון המרוכז, אולם אינם מעשירים אותה בחלבון, כפי שעושים זאת שניים מהמשתתפים בדיון. שלושה בוקרים אמרו שהם משתדלים להשיב יחד את השחת ולחבבה על הבהמות ע"י הרספת מולססה ושלושה אחרים טענו, שאין הם צריכים לדאוג לשינוי צירוף התערובת, כיון שהשחת שלהם היא תמיד ממין משובחת.
- שאלה 8. — מתי מתחילים להגיש שחת לעגלות?
- ת. — רובם מתחילים להגיש את השחת לעגלה בשבוע הראשון לימי-חייה אבל מעירים שבנגיסה ממש מתחילות רוב העגלות רק בגיל של 3 שבועות בערך. אחדים ציינו שהם נוהרים מלהאביס בשבועות הראשונים לחיי העגלה שחת אספסת ומשתדלים לספק שחת מעורבת.
- שאלה 9. — מהו גיל העגלות כשמתחילים להאביסן תחמין?
- ת. — רובם — כשהעגלה היא בגיל של 6 חודשים ואחד מתחיל בהגשת התחמין לאחר שהעגלות התחילו כבר באכילת שחת כלומר — בגיל של 3—4 שבועות.
- בחוברת הבאה תימסר תמצית של "שול-חנות עגולים" נוספים.
- רוכז ע"י: א. י. ה.

הפרשת דיאלדרין בחלב

בשנים האחרונות התפרסם הדיאלדרין כחומר יעיל בהדרכת מזיקים. כידוע תכשיר זה הוא בעל ארסיות רבה והוא מהווה סכנה לבעלי-חיים ולבני-אדם. יקרה שמרססים גם גידולי-מספוא בתכשיר, ומשום כך נערכה חקירה באחת התחנות שבארה"ב אם הדיאלדרין עובר גם לחלב הפרות כשהן ניזונות במספוא שרוסס. החקירה הוכיחה שאמנם אצל ארבע פרות, שהואבסו בשחת שהוכנה משדה מרוסס, נתגלה הדיאלדרין בחלב. כמות הדיאלדרין שרוססה היתה מ-25 עד 50 גרם לדונם. הנסיון נמשך 54 ימים, ומנת השחת היומית לפרה היתה כ-9 ק"ג. תנובות החלב היומיות היו בגבולות 10 ק"ג בממוצע, וכמות הדיאלדרין שהופרשה לתוך החלב נעה בין 6.3 ל-12 מיליגרם. לפי הבדיקות שנעשו בשחת יצא ש-15 עד 31 אחוזים של הדיאלדרין שנמצאו בשחת עברו לתוך החלב.

בחקירות קודמות לזו הוכח שפרות שרוססו נגד קרציות בתכשירים שהכילו דיאלדרין הפרישו אותו לתוך החלב. ריסוס המספוא בשדה בוצע כשבוע ימים לפני הקציר.