

הבקר המקומי אינם מאפשרים בחירת פרות כרצוננו, עלינו להרבות בקניית פרות, על מנת ליצור את הבסיס לבירור בעתיד. יחד עם זאת עלינו לעקוב כבר מההתחלה אחרי התפתחות המבכירות מהדור הראשון אשר בהן נרצה למלא את מקום הפרות הפסולות.

בדיון משותף של הוועדה המקצועית ואנשי ענף הבקר לבשר, התבררה התכנית הקונקרטית של רכישת הבקר המקומי ונקבעו הכללים הבאים לחלוקתו בין המשקים:

(א) מבנה גוף: פסולות לחלוקה תהיינה רק פרות מנוונות וחולות.

(ב) מצב הריון: בכל מצב הריון ואף לא הרות.

(ג) גיל הבהמות: מגיל עגלה ועד פרה מבר גרת במידה שיש לה עדיין שניים בריאות ובמספר מלא.

יוסף רוזנברג

ארגון מגדלי בקר לבשר

למשקים שלנו במצב גופני ירוד מאוד, הבריא חוך תקופה קצרה בלבד מבלי שקיבלו כל תוספת באיבוס.

התכונות האינדיוידואליות של כל פרה ופרה קובעות במידה רבה את גודל הולד ואת קצב התפתחותו, אבל אין ספק שהשפעה מכרעת בשטח זה נודעת לכמות החלב שהולד יונק בתקופת חייו הראשונה. בתצפיות שלנו היינו עדים במקרים אחדים שולד בן השנה כבר עבר במשקלו על משקל אמו. גם במקרים פחות קיצוניים בלט יפה חלקו של החלב במידת התפתחותו של הולד. חותמו המכריע של הפר בהשבת הצאצאים היה ניכר בכל המקרים, גם בעגלים היפים מאוד וגם בפחות יפים.

היום נראית לנו דרך ההכלאה של הפרה המקומית בפרים מגזעי הבשר, כדרך בטוחה ליצירת בקר רב בתקופת זמן קצרה לערך. הבקר הזה יהיה בעל מבנה גוף כבד ובעל כושר רב לקרום בשר. היות ותנאי רכישת

ההרכב של בעלי חיים במשקל שונה

לפי מוריסון, פידטס אנד פדינגס

מינרלים %	שומן %	חלבון %	מים %	
4.3	4.0	19.9	71.8	עגל במשקל 45 ק"ג
4.3	11.2	18.8	65.7	" 135 "
4.5	16.6	18.6	60.3	שור " 315 "
4.0	26.9	17.1	52.0	" 450 "
3.7	32.3	16.0	48.0	" שמן " 540 "
3.2	37.6	15.7	43.5	" " מאד " 675 "
3.0	44.6	12.4	39.8	" שמן באופן יוצא מן הכלל 750 ק"ג
5.1	17.2	20.0	57.2	שור רוזה בן 4 שנים
5.0	20.6	17.2	56.8	פרת חלב
4.2	29.2	15.6	50.2	פרה שמנה
4.7	14.1	18.2	61.9	סוס מבוגר
4.2	24.9	17.4	50.9	טלה שמן
3.4	19.9	15.7	61.0	כבשה לפני ההשמנה
3.5	25.9	15.4	55.2	כבשה חצי שמנה
3.0	37.9	13.0	46.2	כבשה שמנה
3.1	48.3	11.5	37.1	כבשה שמנה מאוד
3.6	3.5	17.8	71.2	אפרוח במשקל 226 גרם
3.7	2.6	22.6	71.1	אפרוח " 453 גרם
3.6	6.6	22.8	65.7	פרגית " 906 גרם
3.1	20.0	19.2	55.8	פרגית " 1812 גרם