

מס' ט'	שם ומספר הפרה	הבעלים	גיל הפרה	ק"ג חלב	ק"ג שומן	שומן %	ימי חלב	ממוצע ליום חלב שומן	מקום התנובה
98	הולנדה 996	בארות יצחק	1'11	4854	189	3.90	345	18.9	בהולנד
			3'1	5577	232	4.16	290	19.2	בהולנד
			4'0	5979	246	4.11	300	19.9	בהולנד
99	שלוח 997	עינת	1'11	3540	156	4.40	300	11.8	בהולנד
			3'0	5592	—	—	383	14.6	בישראל
100	מינה 998	סביצקי, עטרות	2'4	3900	160	4.10	300	13.0	בהולנד
101	ורדה 999	שילר	2'4	4362	177	4.05	300	14.5	בהולנד
			3'2	2487	87	3.50	209	11.9	בישראל
102	יעל 1000	שילר	2'2	4815	182	3.79	304	15.8	בהולנד
			3'1	5388	206	3.82	300	18.0	בהולנד
			4'0	3763	135	3.58	283	13.3	בישראל
103	גריס 1001	זימן, בית יצחק	2'0	4284	166	3.87	340	12.6	בהולנד
			4'0	3586	129	3.60	273	13.1	בישראל
104	טריין 1002	חצרים	1'11	4282	176	4.11	337	12.7	בהולנד
			2'11	6862	295	4.30	377	18.2	בהולנד
105	קדמה 1004	גל און	2'3	4000	159	3.97	300	13.3	בהולנד
			3'2	3698	130	3.50	286	12.9	בישראל
106	אטיה 1005	מענית	1'11	3961	156	3.93	293	13.5	בהולנד
107	לאה 1006	כפר גליקסון	2'2	3572	153	4.28	293	12.2	בהולנד
			3'1	4781	209	4.37	299	16.0	בהולנד
			4'0	4171	164	4.00	267	16.6	בישראל

א. שמאראנד

1955

ריפוי פרים נגועי-טריכומוניאסיס

ד"ר קריסטנסן מהאוניברסיטה בקליפורניה מודיע שפרים נגועים במחלת טריכומוניאסיס ניתנים לריפוי ואפשר שוב להשתמש בהם לרביעה.

כידוע, גורמת מחלה זו של הפרים להפלות אצל פרות שהורבעו בפרים נגועים; ועד עתה היו נוהגים להוציא פרים כאלה לשחיטה, על אף היותם בעלי־ערך רב מבחינה גידולית. לדעתו של ד"ר קריסטנסן מוצדק בהחלט הטיפול בפרים נגועים אלה והרופא הווטרינרי המעשי יכול לבצע זאת. הטיפול הוא: זריקות של נתרן יודי בתוך הווריד ושימוש במשחת בובופלאבין. על הטיפול הזה יש לחזור פעמים אחדות ולכן מציע ד"ר קריסטנסן שהבהמה הנגועה תובא לבית־חולים כדי שהריפוי יהיה יעיל יותר מאשר במשק האיכר.

ד"ר קריסטנסן מספר על מקרה עם פר שמחירו היה 6000 דולר ונמכר על ידי בעליו ב־350 דולר לאחר שנדבק במחלה הנ"ל. אחד הווטרינרים הטיל על עצמו את הטיפול בפר זה תוך שיתוף עם המרפאה הווטרינרית של אוניברסיטת קליפורניה, אשר בדיוויס. לאחר גמר הטיפול הרביע הפר 100 פרות ואף אחת מהן לא הודבקה ולא הפילה.