

משהו מנסיונו הקצר

בהתחלת פברואר 1955 עבר העדר שלנו בעבודת הרפתנים ובתנובת החלב תוך השוואת לסככות עם ריפוד עמוק ונחלב בבית־חליבה 4 החודשים האחרונים ברפת הישנה ל־4 חודשים מיוחד. ניסיתי לסכם את השינויים אשר חלו מקבילים בתנאים החדשים.

התנובה ומספר ימי העבודה בבנינים הישנים

החודש	מספר הפרות	ראשים בעדר	התנובה ליום ולפרה, ק"ג	ימי עבודה	כמות החלב בחודש, ק"ג
אוקטובר 1954	97	190	12.8	220	31.663
נובמבר "	95	189	16.0	208	30.253
דצמבר "	93	199	16.4	216	83.171
ינואר 1955	95	203	19.0	223	40.977

התנובה ומספר ימי העבודה בבנינים החדשים

החודש	מספר הפרות	ראשים בעדר	התנובה ליום ולפרה, ק"ג	ימי עבודה	כמות החלב בחודש, ק"ג
אוקטובר 1955	98	216	16.4	176	33.721
נובמבר "	93	209	17.7	158	34.723
דצמבר "	93	218	18.6	155	34.328
ינואר 1956	90	218	20.9	154	39.815

אולם אין ספק כי תנאי השיכון המשופרים, הגיי-
סה החופשית למספוא הגס, המרבץ היבש והגיי-
קיון — הם הגורמים העיקריים לעליה בתנובת.
המספר הקטן של הפרות, אשר יצאו מסיבות
שונות, אינו יכול להשפיע על ההפרש בתנובה
היומית הממוצעת והכללית, שהוא ניכר למדי.
אם כי השנה מספר הפרות החולבות הוא קטן
במקצת מאשר בתקופה המקבילה אשתקד, הרי
המספר הכללי של הראשים בעדר גדל. בולטת
הירידה במספר ימיה־עבודה בענף כולו, המת-
בטאת בהפרש של 70 ימי עבודה לחודש; זאת
אומרת, קימוץ של 2 עובדים ולמעלה מזה, יום-
יום.
העליה בתנובה היא ניכרת למדי, כמות המזון
איננה שונה ברפת החדשה מזו שברפת הישנה,
ל אריב
עי־שמר, פברואר 1956

הפרשת הדם מופיעה כרגיל כעבור 45—48
שעות מהתחלת התאנה. ריירי־הפרשה אלה שור-
בים מאד בכמותם ובתכולת הדם בהם. הפרשה
זו, יש לראותה כתופעה נורמלית ואין להסיק
ממנה ולא כלום על קליטה או אי־קליטה. הדי-
מום (זיבת־הדם) הזה יכול לשמש עזר רב בגיי-
לוי התאנות ה־"שקטות"; פרה עם דימום —
סימן שעברה עליה התאנה שני ימים לפני זה.
יש לרשום חאריך זיבת־דם זו ולהיעזר בו לשם
גילוי הופעת התאנה הבאה.
רוכזו לפי עלון־הדרכה שחובר ע"י:
ק. ל. פליסספה
רס. ט. קאפס