

ולא נהיה קשורים ביבוא, הגורם תמיד לבעיות (בריאות, זמן המלטה וכו') ומשבש את סדרי העבודה בעדר.

בינתיים הגשמו רק את השלב הראשון בריכישת 100 אמהות, ויש לשער שבזמן הקרוב בירור (כבר בשנה הבאה), עם הכנסתן של המבכירות הראשונות למחזור ההמלטות, נתחיל בבירור והשבחת העדר.

סיכום

יש לחזור ולהדגיש שכל הכתוב כאן אינו אלא התרשמות; והדבר מתפרסם מתוך כוונה להעלות את נסיונו בהקמת עדר בקר בשר וסיגולו לתנאים.

אין ספק שעזרה רבה — הן חומרית והן הדרכתית, הוגשה לנו ע"י המחלקה לבקר, ובעיקר ע"י המדור לבקר לבשר ומדריכיו, עזרה שללא ספק תרמה בצורה מכרעת להצלחת הענף ע"י הקמת תחנת התצפית ועבודת הדרכה ופיקוח מתמידים.

נקוה שהדברים שהעלינו יהיו לעזר למשקים המתחילים בהקמת הענף, שהנסיון בו כה מועט, והוא עדיין עושה את צעדיו הראשונים.

אמנון לוי

משמר העמק, 1958

על טיפול בעיניים ולהגן עליהם מפני החום ע"י צל ומים. נראה לנו, שאם סידורים אלה אינם ניתנים לביצוע מלא, לא כדאי להחזיק בקר זה במרעה בקיץ, כי הדבר יביא להפסדים ניכרים במשקלו של השור.

תכנון העבודה בשטח השבחת העדר

בשטח זה אפשר לציין תכניות בלבד, באשר הגשמתן הוא ענין לטווח ארוך; כרגע אנחנו נמצאים רק בתחילת הדרך.

תוך שיקול האפשרויות הפתוחות לפנינו ולימוד מנסיונם של אחרים הסקנו שיש להגיע במהירות המאכסימאלית לעדר אחיד מבחינת סוג וגזע הבקר. לרשותנו עומדים שטחי מרעה מצומצמים יחסית ועדיין לא ניתן לדעת בדיוק מהו כושר נשיאתו ומה יהיה גודל העדר.

לשם כך החלטנו לרכוש בשלב הראשון מספר גדול יחסית של אמהות (כנ"ל) ויחד עם לימוד כושר הנשיאה של השטח לקבוע את גודל העדר. בדרך זו, באם ניווכח שיש להקטין את העדר או להשאירו בגודלו הנוכחי, נוכל להוציא מיד את פרות היבוא ולהחליפן בפרות בנות הכלאיים מהגידול שלנו.

במידה ונחליט להגדילו (וברור לנו מראש שגודלו לא יעלה בהרבה על 150—180 אמהות) נוכל כבר מעתה להתבסס על הגידול הטבעי,

צריכת בשר בקר בארה"ב עולה וחולכת

בשנים האחרונות גברה הדרישה לבשר בקר בשווקים בארה"ב, ולפי הנתונים הסטטיסטיים משנת 1956 יוצא שמנת הבשר השנתית לנפש בארה"ב הגיעה לשיא של 37.8 ק"ג. העדפת בשר הבקר על פני בשר חזיר באה משום שקהל הצרכנים בוחל בתקופה האחרונה בבשר שמן; ומכיוון שהולך ורב בשר בקר צעיר שאינו כה שמן כבשר בקר מבוגר לאחר פיתום, לכן מתרבים דורשיו.

למניעת הרעלה במרעה עשב סודני

1. יש להקפיד על זרעים נקיים עם זריעת עשב סודני לרעה; כשהזרעים מעורבים בדורת ארס-צובא תכיל צמחיית המרעה הרבה יותר חומצה ציאנית.
 2. יוצאים לרעות במרעה עשב סודני כשהקמה הגיעה לגובה של 45—60 ס"מ.
 3. עשב סודני שנפגע על ידי חורב ממושך מחייב זהירות רבה; מוטב לוותר על השימוש בו בתור ירק, כיוון שריכוזי החומצה הציאנית גבוהים בו מאוד.
 4. אין להוציא בשום פנים בקר רעב מאוד למרעה של עשב סודני.
- אם מקפירים על כללים אלה ברעה בעשב סודני יכול הוא לשמש עזר רב במניעת התנפחות באותם המשקים שנוהגים לרעות גם באספסת; רועים במרעה העשב הסודני בשעות הלילה ובמשך היום רועים בשטחי האספסת.