

סיכום סקר הפרים

ממוצעים של כל הפרים בכל הארץ לפי האגודות להורעה והאזורים בהם פועלות האגודות להורעה

מספר הבנות	גיל ההמלטה הראשונה ימים	חלב ק"ג	שומן ק"ג	שומן %	ימי חליבה	ממוצע ליום חליבה שומן ק"ג חלב ק"ג	פ ר י ס
1. איזור, בו פועלת האגודה להורעה א.ל.ב.							
346	918	4522	158	3.50	291	15.6 0.545	
א.ל.מ. בעדרי האגודה בלבד							
299		4550	159	3.50	291	15.6 0.548	
בעדרים בהם פעלו פרים שלא מהאגודה							
47		4339	153	3.52	291	14.9 0.526	
2. האיזור בו פועלת האגודה להורעה "און"							
1065	907	4292	153	3.57	293	14.7 0.523	
"און" בעדרי האגודה בלבד							
691		4452	159	3.56	293	15.2 0.541	
בעדרים בהם פעלו פרים שלא מהאגודה							
261		4114	148	3.60	293	14.0 0.505	
כפר ויתקין							
113		3723	134	3.60	292	12.8 0.459	
3. האיזור בו פועלת האגודה להורעה "שרות"							
345	917	4374	152	3.48	293	14.9 0.527	
"שרות" בעדרי האגודה בלבד							
168		4388	153	3.48	293	15.0 0.522	
בעדרים בהם פעלו פרים שלא מהאגודה							
122		4057	155	3.44	293	15.4 0.529	
באר טוביה							
55		4036	144	3.57	294	13.7 0.490	
ממוצע כללי							
1756	911	4353	154	3.54	292	14.9 0.527	

ה ע ר ה : נסקרו 1805 מבכירות, אך רק לגבי 1756 מבכירות נמצאו סיכומים של החלב והשומן.

יעקב פלג
מנהל ענף ההשבה

.....

מה עדיף – שחת אספסת או תחמיץ אספסת ?

הפרות מעדיפות את השחת על פני התחמיץ. באוניברסיטת יוטה (ארה"ב) נוכחו על סמך מחקר של שלוש שנים שהפרות צרכו יותר חמרי מזון, יצרו יותר חלב ושמרו יותר טוב על מצב הגוף שלהן כשאכלו את האספסת בצורת שחת במקום אספסת כתחמיץ. החוקרים טוענים שהענין בהחמצת האספסת התעורר בעקב הקשיים בהתקנת השחת באיזורים גשומים ולחים, וכן הודות להתפתחות שחלה במיכון קציר המספוא. בניסויים שערכו הועמדו שתי קבוצות של פרות למשך 133 ימים. הקבוצה האחת בת 16 ראש ניוונה בתחמיץ אספסת, והקבוצה השניה, גם היא בת 16 ראש, קיבלה שחת אספסת. קבוצת התחמיץ הניבה בממוצע יומי 11.5 ק"ג חלב, לעומת 12.5 ק"ג שהניבה קבוצת השחת. יתר על כן, הפרות מקבוצת התחמיץ, משקל גופן פחת ב־133 ימי הניסוי ב־74.7 ק"ג לכל ראש בממוצע. לעומתן פרות השחת כמעט ששמרו על משקל גופן עד סוף הניסוי והפסידו בממוצע כ־3 ק"ג בס"ה.