

הרכבת חיסון נגד הצהבת המידבקת נתגלית
תה כיצילה בשמירה על בהמות בריאות; עם
זאת נדרשים מחקרים נוספים על מנת להגביר
את יעילותה.

הרכבת החיסון הנה יעילה ביותר בהינתנה
מיד עם ראשית התפרצותה של המחלה.

על מנת לצמצם את מספר ההפלות ואת הת-
פתחויותיה החמורות של המחלה בחזירים נראה
כי יש צורך לחסן את כל החזירות לפני כל
עונת הרבעה. מחקרים בבקר העלו כי השפעתו
של החיסון נמשכת שנה עד 15 חודש ואף יותר.
לפיכך יש צורך בהרכבת חיסון מדי שנה עד 18
חודש.

יכול אתה לשאול: האם עלי לחסן את כל
הבהמות בעדרי? עליך לשקול את הדבר בזהיר
רות:

1. האם ישנה הוכחה להידבקות במחלה בעת
האחרונה בעדרך.

2. האם עדרך נמצא בשכנותו של עדר נגוע.
או שהוא שותה ממימי של נחל שעבר קודם לכן
בנחלתו של משק נגוע.

3. האם חלק מבהמותיך חזר מתערוכות או
ירידים.

4. האם קנית בהמות חדשות.
בדרך כלל מחסנים את כל הבהמות בעדר,
פרט לבהמות חולות, או בהמות מבוגרות שאך
זה החלימו מן המחלה, או בני בקר שגילם
פחות מ-3 חדשים.

נמצא כי המחלה עצמה „מקצרת את ימיה“
בעדרים קטנים, בעוד שבעדרים גדולים נוטה
היא לקנן זמן רב.

א. וואלפר

(מתוך הווארד'ס דיירינג, אוגוסט 1958)

שהתפלה נגרמת על ידי היווצרות חמרים ארסיים
(טופסינים) בגוף האם.

בחזירים אין סימני המחלה כה חמורים
כבבקר. שלב החום הינו קצר ביותר. הפלות הינן
כנראה הסימן העיקרי בחזירים.

עדרי אינו נגוע במחלה זו, כיצד אוכל
למנוע הידבקות?

1. החזק את הבקר, החזירים ושאר סוגי הבה-
מות בנפרד.

2. מנע גישתן של הבהמות לורמי מים, ובעי-
קר למקווי מים עומדים, בריכות וקרקע ביצתי.

3. השמד והדבר חולדות, עכברים ושאר מיני
מכרסמים. במידת האפשר, מנע גישתם של כלבי
רחוב וחיות אחרות.

4. בקנותך בהמות חדשות, וודא כי אמנם
נבדק דמם לגבי מחלה זו וכי תוצאת הבדיקה
היתה שלילית. בודד בהמות כאלו משך שלושה
עד ארבעה שבועות.

עדרי נגוע במחלה זו, מה עלי לעשות
כדי להיפטר ממנה?

עקב מספר גורמים בלתי קבועים ומשתנים
אי אפשר לתת המלצות מפורטות בעניין זה.
להלן מובאות מספר עובדות המופיעות בעדרים
נגועים:

בהמות נגועות מתחסנות או שמבריאות מן
המחלה. משך החסינות שונה בבהמות השונות.
בדרך כלל נמשך הוא מספר שנים. חלק מן הבה-
מות המבריאות ממשיכות לשמש מקור להפצת
גורמי המחלה חזן מחוות סכנה לגבי בהמות
אחרות העוללות להידבק.

כיום לא ידועה עדיין שיטה מעשית לזיהוי
בהמות הנושאות את גורמי המחלה. לפיכך יש
להניח כי ההרכבה נגד המחלה תהווה גורם מכ-
ריע בכל תכנית שהיא להדברתה.

20 אחוז מההוצאה למזונות — לחלב ולתוצרת חלב

בשנת 1957 היתה התצרוכת הממוצעת של חלב ותוצרי חלב לכל נפש בארצה"ב כדי 315 ק"ג. צריכת חלב
שחיה היתה בגבולות 150 ליטר לנפש; בצורת שמנת נצרכו 25 ליטר חלב; מנת החמאה השנתית עמדה
על 3¼ ק"ג לנפש. משאר תוצרי החלב נצרכו לכל נפש באותה שנה: 3½ ק"ג גבינה קשה, 6.8 ק"ג חלב
מעובה, 2½ ק"ג אבקת חלב רזה, 20 ליטר גלידה ושאר תוצרי חלב קפואים. 2¼ ק"ג גבינה רכה, 5½ ליטר
חלב רזה, 17 ליטר חובצה ר"ג 4.5 ליטר שוקו.

20 סנט מכל דולר שהוצא למזונות יצאו לקניית המזונות שנמנו לעיל.