

במרעה יחד עם הפרות ולמכור אותם (יתכן אף בריווח) לאחר העונה.

2. אחוז ההתעברות יהיה ללא כל ספק גבוה יותר, כי בכל עדר אפשר יהיה להחזיק גם עגלים אחדים, וכידוע פרים צעירים הם גם פוריים יותר.

3. יוגבר כושר הנבית החלב בצאצאי הכלאה זו, ובמשקי השדה" תימצא גם האספקה לשמירה על התנובה משך תקופה ארוכה יותר.

4. עבור השגר המפוסם שיימכר לבשר יושגו מחירים יותר גבוהים.

מן הראוי, אם כן, שיושם לב להצעתו זו עם כינון עדרי הבקר לבשר בהתישבות החודשה.

צבי מרגלית

מדריך חבלי לבקר

2. הפרות המעורבות שתגודלנה מפריים הולנדיים אלה תנבנה ללא כל ספק יותר חלב מאשר הפרות המעורבות מפריי הבשר. הודות לזה יהנו הוולדות שיגודלו לבשר (הזכרים) לכמויות גדולות יותר של חלב, מה שישפיע גם על גדילתם המהירה; ולאחר הגמילה, ואולי לפני זה, יוכלו בעלי הפרות גם לחלוב כ-2—3 ליטר חלב לצרכי הבית; וגם בזה אין לזלזל כל עיקר.

מן הראוי לציין עוד שבשוק הבשר בארץ מעדיפים את העגלים המעורבים מצאצאי הפרים ההולנדיים על פני הגזעים האחרים ואף משלמים עבורם מחירים גבוהים יותר.

בין היתרונות שבשיטה זו אמנה איפוא סעיפים דלהלן:

1. הרבעת הפרות לא תעלה בכסף כלל, כי העגלים ההולנדיים האלה אפשר יהיה להחזיק

זו פות

• עצת כלכלנים לחקלאים באמריקה: ישאף כל איכר לכך שהכנסת הברוטו מהמשק תהי' **לפחות פי שניים** מההכנסה נטו, אליה הוא חותר.

• ידוע הדבר שמוג אויר הם גורם לירידה באחוזי השומן שבחלב. ניסויים ותצפיות שונות הוכיחו שכל ירידת חום של 5.5 מ"צ בתחומי הטמפרטורות של 16° ו-0° מביאה עמה עליה בשומן כרי 0.2%.

• מומחי תזונה בהמות הבית קבעו על יסוד ניסויים מהומן האחרון שערבן המזוני של שזרות התירס שווה ל-3/5 של גרגרי התירס.

• בשנת 1957 הורעו בארצות הברית 6 מיליון פרות חלב.

• מדענים גרמנים מודיעים שהצליחו לייצר משקה תוסס של חלב המוצ' שנתקבל יפה בשוק. בשווייץ הוציאו לשוק משקה מירגינה בלתי אלכוהולי, מקציף, בעל גוון חום-צהבהב שנקלט יפה בשוק המשקאות הקלים.

• פרת החלב היא היצרן היעיל ביותר של סידן; היא מייצרת פי עשר מאשר התרנגולת, שנחשבת כבעל החיים ה"זריז" ביותר בייצור הסידן מהמזון הנאכל.

• המבנים לנפש הפרה אומרים שחיכתה של פרה מרוצה ושמחה בחלקה מתבטא בזקיפת תאונניים והטייתם קדימה ובהברקת עיניה.

• חמרי המזון שבחלב שחינם כה חשובים בתזונה הילדים, דרושים גם לבני אדם מבוגרים, אם כי לא תמיד בכמויות כה גדולות. הילדים זקוקים לליטר חלב ביום כדי לספק את צריכתם בסידן והמבוגרים זקוקים לחצי ליטר לפחות.