

המשק	פרות בממוצע	חלב ק"ג	שומן ק"ג	תנובה ממוצעת %	המשק	פרות בממוצע	חלב ק"ג	שומן ק"ג	תנובה ממוצעת %
152. מקוה-ישראל	57.0	4898	190	3.87	160. משמר-דוד	69.7	4705	158	3.36
153. לוחמי-הגיטאות	83.6	4895	173	3.53	161. גזית	53.6	4694	158	3.36
154. בני-דרום	55.2	4884	178	3.65	162. לביא	50.3	4654	163	3.51
155. געש	58.2	4811	172	3.58	163. גלים, כפר-הנוער	28.4	4479	172	3.84
156. מחניים	46.3	4803	172	3.59	164. שדמות-דבורה	223.8	4358	157	3.60
157. להבות-הבשן	72.1	4778	165	3.45	165. הבונים	51.6	3968	143	3.61
158. בית-השיטה	74.9	4752	154	3.24	166. עין-גב	52.0	3920	132	3.38
159. כפר-דיתקין	651.7	4745	164	3.45	א. שמאראנד				
					ינואר, 1961				

המולאסה באיבוס בקר החלב

בזמן האחרון הופיעו במספר משקים חביות עם מולאסה (מסלק סוכר) ורבים שואלים על ערכו המזוני של מספוא זה, הכמות היומית, אופן השימוש וכו'. ראשית — יש לבקש תוצאות הבדיקה הכימית מאת ספקי מספוא זה. לפי מוריסון — הרכבה של מולאסת סלק סוכר היא כדלהלן:

80.5% חומר יבש
4.4% חלבון כללי נעכל
0.05% סידן
0.02% זרחן
60.8% כלל חומרים נעכלים

1.3 ק"ג ערכם המזוני כיחידת מזון אחת (התנודה 1.1 — 1.5 ק"ג).

בדרך כלל מתאימה המולאסה לאיבוס בהמות העבודה ולבקר מרבק, אולם משתמשים בה גם בהזנת בקר חלב, אם כי תוך זהירות. מרגילים בהדרגה את הבהמות למזון זה, כי אחרת תגרום המולאסה במנות גדולות יותר לשלשול קשה. על כל פנים אין המנה היומית צריכה לעלות על 1½—1 ק"ג ולפריות בהריון אף פחות מזה, כי הן עלולות להפיל.

הצורה הנוחה ביותר בהגשת המולאסה — ערבוב במנת המזון המרכזי. מנות ה"הכנה", כ־6 שבועות לפני ההמלטה, מוטב שתהיינה ללא מולאסה.

שחיטת בקר בכתי מטבחיים בתשי"ט ובתש"ך

	תש"ך	תשי"ט	עליה ב־%
פרות	14,238	9,214	54.5
עגלים	34,515	27 658	24.8
עגלות	8,746	3,265	182.0

ת י ק ו ן

בזוהרת 42 פורסמה רשימתי בנושא „מה בין פרים צעירים לפרים בדוקים” ולצערי נשתרבה אי־דיוק בניסוח מסקנה 3, שהגני מבקשו לתקן. לא אמרתי „העדפת פרים בדוקים על פרים צעירים אינה נראית מוצדקת פרט למקרים של פרים מצטיינים, שמתגלים בין הבדוקים”, אלא — „הקטנת השימוש בפרים צעירים לטובת חשימוש בפרים בדוקים טובים פרט למצטיינים אינה נראית מוצדקת”.

בכבוד רב

ר. בר ענן