

מרובה על הברי! הנכון הוא שפרשת ההזנה כרוכה בתנאים אוביאקטיביים (קרקע, מים, אק" לים) וסוביאקטיביים (נטיות וידיעות עובדי המספוא והרפת, וכשרונותיהם) בכל משק ומשק, ואילו אצלנו — תנאים אלה טרם נתבררו והתגבשו ד" הצורך.

עלינו להקדיש תשומת-לב יתרה לבעיות הטיפול — קביעת הזיווגים הרצויים לפרותינו — על מנת לשפר את הנכס הגנאטי בעדר, שהינו „משובש" במידת-מה בשל חטאי-עבר, בטרם הופעלה באזורנו ההזרעה המלאכותית, ויתכן גם מחמת „מחלות הילדות" של ההזרעה המלאכותית בימיה הראשונים.

עלינו להתעניין יותר גם בבעיות הכלכליות של הענף וללמוד אותן, למען נדע להכריע אל נכון בשאלות סלקציה, בקביעת שיטות הזנה וטיפול שיבטיחו מישוק ראנטאבילי של הענף.

מטרותינו העיקריות בתשכ"ב — לשפר במידת ניכרת את תנובת החלב ויחד עם זה להמשיך בהגדלת העדר, וכן להגדיל ולייצב את צוות העובדים בענף.

י. פ.

חולתא, נובמבר 1961

שרתם, שאפילו תוך שבוע ראשון לכניסתם לעבודה זוכים בתפקיד של חולבים!

הפתרון הוא — הוספת חבר אחד, לפחות, לצוות הקבוע, ואז נוכל להרשות לעצמנו להכניס רק נחלאי אחד מכל קבוצת הכשרה לעבודת הרפת ואת אימון ילדינו בענף זה נוכל לדחות עד הגיעם לגיל מבוגר יותר (לא לפני הגיעם לכיתה י"א).

רק בסוף שנה זו הצלחנו להגיע להישגים נורמאליים בגדילתם של עגלי המרבק. עד כה בלט לעין-כל פיגורם בגדילה. הודות לשקילות סדירות ועריכת ביקורת לגבי הנורמות נתגלה לנו שעיקר הפיגור היה בחודשי הינקות. השנה שינינו את שיטת ההגמעה וההזנה, ומסתבר שתיוקנים אלה וכן שיפור בשיכון העגלים הביא לתוצאות טובות. אמנם אין זה משתקף לעת עתה בהגברת השיוק, כי רק בתשכ"ב יוכל להתבלט השינוי לטובה.

אנו מתלבטים עדיין לא מעט בבעיות ההזנה. טרם נסתיים הוויכוח בארץ בדבר עדיפות שיטה זו או האחרת. כן מופיעות הצעות חדשות מדי פעם, כגון: מרעה במקום ירק עונתי קצור, מספוא ירוק לעומת תחמיץ וכדומה; השמא

תפוחות הכרם אצל עגלות

מתוך 21 מקרים של תפוחות-הכרם בעגלות בגיל של 1–3 חודשים באיזור הגליל העליון בשנה האחרונה — 19 ארעו בשני מושבי-עולים ושני מקרים במשקים קיבוציים צעירים. במקרה אחד נותחה הגווייה ונמצא מסמר בבית-הכוסות של עגלה בת 3 חודשים; את כל יתר המקרים יש לראות כתוצאה של הזנה לקויה או טיפול מוזנח, והעגלות החלימו מיד לאחר שתוקנו הנוהגים הפגומים.

תפוחות-כרם אצל עגלות/עגלים בגיל 1–3 חודשים מופיעה בדרך כלל מחמת הזנה לא נכונה או נוהגי מימשק פגומים. הסיבות הן: זלילה בגלל הפסקות ארוכות מדי בין ארוחה לארוחה, או חוסר נזילים יחסי, חלב קר, שחת מאיכות ירודה, אכילת רפד ובליעת אוויר בשעת שתיה מהירה מדי.

משטר האכלה קבוע ותפריט מוזנח נכון ימנעו ברוב המקרים תפוחות כרם בבני-בקר. אני נוהג להמליץ על הוספת $\frac{1}{3}$ ליטר מי-סיד לחלב, או הוספת כוס שמן פאראפין לתערובת במקרים חמורים יותר. לעתים רחוקות יקרה גם שהרכב הפאונה בכרם הינו פגום ויעוצה הצעה להלעיט את העגלה בכופתת גירה שמוציאים מפי פרה בריאה, או שמכינים כעין בליל משארית התערובת שבאיבוס הפרות, אשר נרטב במיצי הקיבה בשעת העלאת הגירה של הפרות.

ד"ר קמחיין

רופא „החקלאית"

קרית-שמונה, דצמבר 1961