

אל השיליה ולאכלה. רוב הרפתנים הטובים שורפים או קוברים את השיליה כדי למנוע הפיכת מחלות. באם השיליה לא יצאה תוך 48 שעות מזמן ההמלטה, פנה לרופא הווטרינארי.

הפרה תהיה צמאה מאד לאחר ההמלטה. רצוי לסגור את השוקת שבקרבתה ולהביא לה מים אחרים, מאחר שהמים שבשוקת עלולים להיות קרים מדי. במזג אויר קר רצוי להגיש לה מים מחוממים במקצת.

השגח על המבכירה, במיוחד בימים הראשונים של לאחר ההמלטה. שים לב אם אין היא מגיבה לה סימנים של קדחת חלב, מאסטיטיס, או כל מחלה אחרת.

המבכירה חדלה מעתה להיות עגלה הופכת אם, מכאן הלאה תזכה בטיפול שלא יהיה שונה מזה הניתן ליתר הפרות שבעדר. עתה היא חברה שוות זכויות בעדר החלב.

(תורגם מ„הוארדס דיירימן“, 25 באוקט' 1963)

נהגו לעשות כך; בכל זאת זהו אמצעי טוב וכדאי להנהיגו, מפני שטבור העגל הצעיר הוא מקום נוח מאוד לחדירת זיהומים. וולד אחד שניצל הדות לטיפול זה, ערכו עולה בהרבה על כל התכשירים האנטיספטיים שתצטרך לקנות לכל העגלים שיוולדו במשך שנים רבות.

אם ההמלטה עברה בצורה נורמאלית, יקום הוולד החדש תוך זמן קצר על רגליו הרועדות ויהיה מוכן לקבל את המנה הראשונה והחשובה של הקולוסטרום. רחץ וחטא את העטין כדי להבטיח שיהיה נקי לקראת ארוחתו הראשונה של העגל.

הרחק את השיליה מיד לאחר שתצא. אנסי-טינקט הפרה דוחפה לאכול אותה וקיימת הסכנה שתחנק בזמן בליעת הרקמות, או שתסבול מהפרעות עיכול. אם השיליה לא יצאה עד שהפרה גמרה ללקק את העגל, כדאי לכלוא את הפרה בסגר; בדרך זו לא תוכל הפרה להגיע

מחיר ליטר חלב בבקבוקים בארצות אירופה המערבית

הארצות	% השומן בחלב	אגורות
שבדיה	3.0	50.0
אנגליה	מלא	49.0
שווייץ	מלא	45.5
לוקסמבורג	3.0	43.4
גרמניה המערבית	3.0	42.0
בלגיה	3.2	40.6
צרפת	3.0	40.0
הולנד	3.0	37.8
איטליה	מלא	37.8
דניה	3.8	36.4
אוסטריה	3.6	34.3

✱

● כישלון הגירוי בפרות לקראת החליבה הוכר כגורם חשוב מבחינה תורשתית, הגורר אחריו התייבשות מהחלב בטרם מועד; מסקנה זו הוסקה ממחקר שנערך במינסוטה. מן ההכרח הוא שהפרות יפרישו את ההורמון „אוקסיטוצין“ כתגובה לגירוי (עיסוי העטין, רחיצה וכדומה). התרגשות בשעת החליבה עלולה לבקום הפרשה זו, ואז החולב יוכל לקבל מהפרה רק אותה כמות החלב שנצטברה קודם לחליבה בבריכת העטין. טיפול גס, משטר עבודה מופרע, שיכון ברפת חדשה, או כליאת הפרה בעמדה חדשה — כל אלה עלולים להביא צרות על בעל הפרה.