

הדלקת נושאת אופי חמור יותר יש להיעזר לעתים בהזרקת תכשירי סולפא או חומרים אנטיביוטיים בעלי תחום פעולה נרחב. יש ומתפתחת דלקת באחר מפרקי האצבעות התחתונים. במקרים כאלה אין די בדרך כלל בטיפולים שנמנו לעיל. במקרים כאלה ממליצים על קיטוע הטלף כטיפול המוצלח ביותר. פרות בעלות טלפיים גדומים „מסתדרות” לגמרי לא רע.

מניעה — האמצעי הטוב ביותר

יש לאחוז בכל אמצעי הזהירות שאפשר להעלות על הדעת כדי למנוע חבלות וזיהומים ברגליים. הרחק תיל מן החצרות ומשטחי המרעה, סלק אבנים, שיחים דוקרניים, שלף נוקשה וכדומה. מלא בורות ומהמורות בחול או חצץ או שתדףץ בכטון או באספאלט. יש בוקרים המצמצמים את הדלקות ברגליים על ידי שהם מציבים במפתני המעברים, בהם עוברות הפרות הלוח ושוב, מיכלים עם סיד חי, בו דורכות הפרות בעברן. אם תערב 5 ק"ג גפרת נחושת ב-100 ק"ג סיד, יהיה האמצעי הזה יעיל יותר. אם מעדיף אתה את השימוש בתמיסה נוזלית, תוכל להמיס 0.5 ק"ג גפרת נחושת ב-20 ליטר מים ולהעמיד את התמיסה במיכל אטום ושטוח. תמס את המיכל כך שהפרות הפגועות תוכלנה לעמוד בתוכו בנוחיות משך 10-15 דקות מדי יום. **א. וואלפר**

(מתוך „הוארד'ס דיירימן”, דצמבר 1964)

דרך אחרת לטיפול בטלפיים היא הכנסת הבמה לתוך סד מיוחד לכך, המצוי במשקים רבים, ואשר מצוי גם כדגם מיטלטל המועבר ממקום למקום על ידי הרופאים, או המומחים לטיפול בטלפיים.

בטרם ניגשים לטיפול במקרה צליעה זה או אחר יש לברר ברר היטב את הגורם לצליעה. לעתים קרובות הגורם לצליעה, ואף חמורה ביותר, הנו בלתי ברור ונסתר.

הטיפול

אם חדר מסמר לרקמה הרכה שברגל יש להרחיקו ולדאוג לניקוז טוב של מקום הפצע. ביחד עם שאר תרופות (שלא דרך המעינים), ממליצים במקרים כאלה על חבישה סטאטילית. כמו כן יזריק הרופא זריקה נגד צפדת (טא'טאנוס).

דלקת שטחית לכאורה בין הטלפיים יכולה לעתים קרובות לגרום לצליעה חמורה. בדרך כלל ניקוי יסודי של מקום הדלקת באמצעות סבון ומים ואחר כך טיפול בחומרים מחטאים חיצוניים יביא לידי ריפוי גמור. אם אפשרי הדבר, החזק את הבהמה בעמדה נקייה, מרופדת היטב והרחק מכל רפש וזוהמה. במקרים חמורים יותר יתכן ויש להמליץ על חבישת הרגל.

אם אבן חצץ או שיפוד עץ קטן חדר אל רקמת הרגל הרכה, יש להפגי את הלחץ על ידי הרחקת הגוף הזר וכן לצמצם במקצת את הרקמה הקשה מסביב על מנת לרווח את המקום. אם

ייצור חלב והשימוש בו בשנת 1963/64 בדנמרק

בשנת 1963/64 עלה הייצור הכללי של חלב בדנמרק לעומת השנה שעברה ב-61 מיליון ליטר והגיע ל-4,771 מיליון ליטר. ייצור החמאה הגיע ל-153 מיליון ק"ג, גבינה 124 מיליון ק"ג, קאזאין 500,000 ק"ג; 569 מיליון ליטר עובדו לחלב מרוכז, אבקת חלב ועוד. הייצוא הדני של מוצרי חלב הגיע בשנת 1963/64 לכמויות דלהלן: חמאה 101 מיליון ק"ג, גבינה 80 מיליון ק"ג, חלב ושמן 30 מיליון ק"ג, חלב מרוכז 40 מיליון ק"ג, אבקת חלב 39 מיליון ק"ג. הדנים עצמם צרכו כ-20% מכל הייצור הנ"ל.

ייבוא בקר רבייה לניו-זילנד

לאחר שייבוא בקר חי מאירופה נאסר, זה שישים שנה, מחמת החשש להעברת מחלת הפה-הטלפיים, עומדת הממשלה הניו-זילנדית להתיר ייבוא בקר מגזע שארולה וסימנטאל לצרכי רבייה בתנאים שכמותם טרם נודעו בעולם. הבקר המיועד לייבוא יצטרך להימצא שישה חודשים בהסגר בארץ המוצא ועוד שישה חודשים לאחר הגיעו לניו-זילנד. המגדלים בניו-זילנד מנסים לקצר את זמן ההסגר לשישה חודשים בלבד, כולל ההובלה בים, ודורשים ביטוח ממשלתי למקרה של התגלות המחלה בתקופת ההסגר.