

ההמלטה, שהיו אמנם בחזקת השערה או אומדן, אבל לא נבחנו ולא נמדדו במדויק. ויתכן שאחת התוצאות החשובות ביותר של ייבוא השארולה היא — פתיחת הפתח לאימפורטים נוספים של בעלי-חיים — יהי של בקר, צאן או חזירים. ההתנגדויות לייבוא הוכרעו ובוטלו לאחר חקירה ובדיקה אוביאקטיבית של עובדות; ומאז בוצעו, כאילו בשקט, אימפורטים נוספים של בהמות רבייה מעבר לים לתכלית ההשבחה של כל סוגי המקנה המקומי. זוהי הגישה הנכונה לטיפול בעלי-חיים. כל מטפח חייב לחתור להפיק את התועלת מהנכס הגאנאטי המשובח ביותר המצוי אי-שם בעולם. באנגליה „נשבר הקרח“ מבחינה זו באמצעות השארולה — וזה השתלם.

תרגום מקוצר של החוברת
 "The Charolais Report"
 שהוצאה לאור ע"י MMB
 י. עצמון

תפוקת הבשר בשארולה היא כ-1% גדולה מזו שבבקר אחר.

בטיכוס הניסויים המקיפים בשארולה במוסדות המחקר ובמשקים, וכן תוך שמיעת חוות דעתם והתרשמותם של בעלי האיטליונים, אפשר להסיק שהשימוש בגזע זה לייצור בשר בעדרים החלב באנגליה, ובייחוד בגזעי החלב הקלים, הוכתר בהצלחה ולא נכזבו התקוות שתלו בייבוא השארולה.

מחברי החוברת מסיימים את הדבר בדברים דלהלן: בניסיון הייבוא של השארולה יש לראות חשיבות נוספת: הוא עורר את בוקרי אנגליה ללמוד על מהות גזעי הבקר שלהם דברים שלא ידעום עד עתה; הם יודעים עכשיו על מהירות הגדילה, נצילות המזון ואיכות הטבחה של הגזעים האנגליים הרבה יותר ממה שידעו עד לייבוא של השארולה; נתגלו להם ההבדלים האיזוריים במשקל הלידה של הוולדות וקשיי

איפה לחלוב — בעמרה או במכון אידרה?

החוקרים ג'ארווב וקרוסטאנוב (בולגריה) בחנו במשך שתי שנים את השפעת מקום החליבה על התגובה, התעברות, אורך תקופת היובש וכר' בשתי קבוצות של פרות שניזונו והוחזקו בתנאים שווים, אלא שקבוצה אחת נחלבה בעמדותיה ברפת והקבוצה השניה — במכון חליבה מטיפוס אידרה (שדרת-דג). התוצאות, המובאות להלן, מראות שאומנם הייתה השפעה בולטת למקום החליבה וההפרשים בתגובה וכר' הם בעלי ערך כלכלי לא מועט.

פרטים		שנה ראשונה		שנה שניה	
		קבוצה א' ¹	קבוצה ב' ²	קבוצה א'	קבוצה ב'
מספר הימים מההמלטה עד להתעברות, בממוצע		112.5	81	111	82
מספר ההזרעות להתעברות, בממוצע		3.5	2.3	3.0	2.5
מספר הפרות ההרות		15	16	13	13
ימי חליבה בתקופה, בממוצע		232.6	278.4	241.8	283.4
ימי יובש, בממוצע		132.4	86.6	124.2	82.6
תגובת החלב לפני תקופת הניסוי, ק"ג (4%)		3510	3592	—	—
תגובת החלב בתקופת הניסוי, ק"ג (חלב 4%)		2574	3821	2619	4013

¹ הפרות מקבוצה א' נחלבו במכון אידרה; ² הפרות מקבוצה ב' נחלבו בעמדות רפת רגילות.

במשקל הגוף של הפרות לא חלו שינויים והפרשים בעקב השוני במקום החליבה, אולם נצילות המזון הייתה, כמובן, פחותה בקבוצה א' — מחמת פחיתת התגובה.