


## לידתו של עגל

הח' מאיר גודל משלוחות, שתחביבו הוא צילום, מצא עניין בהנצחת לידה נורמאלית לשלביה השונים; והודות לאדיבותו של הח' משה כץ יש באפשרותנו לפרסם תמונות אלה, תוך הוספת מילים מספר להסברת כל שלב בתהליך הלידה. חבל שהצלם לא השגיח ב"בקבוק" (או השלפוחית) ולא צילם אותו, כשלב חיצוני ראשון בלידה, אך ייתכן שהוא התפוצץ, כפי שקורה על הרוב, בצינור בית-הנרתיק.

תמונה 1. קצות הרגליים כבר הופיעו ואנו יכולים להיווכח שתחתיות הטל-פיים מופנות כלפי מטה — סימן שזוהי לידה קדמית.



תמונה 2. חבלי הלידה גוברים (ראה הפניית ראש היולדת); פי הנרתיק מתמתח לקראת יציאת ראש הוולד.



תמונה 3. הראש והכתפיים בחוץ, ליולדת הוקל במקצת לשעה קלה.




תמונה 4. היולדת מתאמצת שוב  
לקראת יציאת אגן-הירכיים.




תמונה 5. כנראה שבוולד הזה אגן-  
היירכיים לא היה רחב מהרגיל ולא  
נדרשו מאמצים רבים בשלב הגמר של  
הלידה; חזותה הרגועה ורביצתה  
השקטה של הפרה מעידות על כך.




תמונה 6. האם חשה להגיש את  
הטיפול הראשון לרך הנולד — לייבשו  
ולחממו — וה"שכנות" מוכנות, כנ-  
ראה, לסייע לה בטיפול זה.



תמונה 7. הרפתנים דאגו שהאם  
תוכל להתייחד עם פרי-בטנה, ללא  
עזרת השכנות.



תמונה 8. הרך הנולד קם על רגליו  
וניגש, בהדרכת אמו או בעזרת הרפ-  
תן, לטעום מהארוחה הראשונה —  
הטעימה והמבריאה ביותר.



המערכת מביעה את תודתה לצלם  
מאיר גודל ולמשה כץ, רכז הרפת, על  
היענותם למסור לפרסום את תר-  
מונות הנ"ל.

י. ע.

▲ באחד העתונים נאמר שבתוצאות מחקר נתגלה ששיעורי התחלואה בסרטן הקיבה ביאפאן הם מהגבוהים בעולם. על יסוד בדיקות שונות מצאו שקיים הפרש ניכר בשכיחות חולי הסרטן בין שותי חלב לבין הממעיטים בשתיית חלב. מתקבל הרושם שהחלב משמש גורם מרתיע לגבי סרטן הקיבה.