

ון-דר-הודן, שהודפסה בעודו בחיים היתה: „עשרים שנות מחקר באפידמיולוגיה של לאפ-טוספירוזיס בישראל“. („רפואה וטרינארית“, כרך כ"ד חוב. ג', ספטמבר 1967).

עוד משחר ילדותו היתה לו נטיה מיוחדת לציור, ואף נרשם כתלמיד בבית-הספר לציור. מורהו לציור בביה"ס התיכון, הורה גם בביה"ס לציור, ומאחר ששמע מכל המורים שתלמידו מצטיין בכל המקצועות השפיע עליו להמשיך בלימודיו הכלליים. הציור היה תחביבו של ון-דר-הודן בכל שנות חייו. החופשות שלו היו קודש לציור. בהולנד הוא היה חבר-חובב באיגוד ציירים.

פרופ' יעקב ון-דר-הודן מילא עד תום את המימרא „הצנע לכת“. הוא לא סיפק חומר רב לעתונות (כוונתי-לעתונות הלא מקצועית) וסלד מפני פירסום.

חבל על דאבדן ולא משתכחין

שי גור

המזון והחקלאות של האו"ם (FAO) החל משנת 1951.

בשנת 1964 יצא לאור, בהולנד (באנגלית) הספר Zoonoses, שאותו ערך ובו כתב כמה פרקים, ביניהם: על שחפת, ברוצלוזיס ולאפ-טוספירוזיס. גאה היה שבספרו זה השתתפו מתוך עשרים ואחד מחברים, עשרה ישראלים. ועוד 2-3 יהודים מהולנד ומארה"ב.

בשנת 1966 הוזמן ל-Alma Mater שלו, ה' אוניברסיטה של אוטרכט, וזכה להיות הראשון לקבל את מדליית הזהב על שם פרופ' סחורנאכל (Prof. Schornagel).

לפני מספר חודשים פנה אליו איגוד המ' זון והחקלאות של האו"ם שברומא, וביקשו לנסוע לכמה חודשים לתורכיה על מנת לעזור שם בבעיית הלאפטוספירוזיס, וזאת — לפי בק' שחם המפורשת של השירותים הווטרינאריים התורכיים. מפאת מצב בריאותו, דחה פניה זו. דומני שעבודתו האחרונה של פרופ' יעקב

▲ בנהלל, כבמושבם אחרים, מבוטחים בביטוח פנימי גם הולדות הרכים ביותר ובכל המקרים של תמותה בלידה ועד לגיל של שבוע לאחר הלידה מוענק פיצוי מסויים. בשנת תשכ"ו היו בעדר נהלל 527 המלטות ובס"ה נפסדו 36 וולדות; בתשכ"ז היו 533 המלטות ומקרי התמותה הסתכמו ב-31 וולדות. הביטוח הפנימי הנ"ל חל גם על מקרי תמותה מחמת לידות-תאומים, וולדות בלתי נורמאליים ושחיתות-דחק עד לגיל של שבוע.

גם בנהלל מתגברת הנטיה להרחיב את ענף גידול העגלים לבשר; אין מסתפקים בעגלים ילידי-המקום וקונים כ-600 עגלים מהחוץ.

▲ הרגעה חורמונאלית בעגלי מרבק. לשם מניעת „רכיבת“ העגלים זה על זה, ניתן להם טיפול ב„כלורמאדינון“, ובאמצעי זה קיוו למנוע את ביזבז האנרגיה בעגלים, שייתכן והוא משפיע לרעה על התפתחותם. תוצאות הטיפול הזה הוערכו ונימדדו עם גמר הפיטום ע"י מדידות האשכים, בדיקתם ההיסטולוגית, מדידת הקוטר של צינוריות האשכים וגודל גרעיני-התאים של לידיג. נתברר שהירידה בתיפקוד ההפרשה הפנימית (האנדוקרינית) של האשכים גררה אחריה פחיתה בניצול יעיל של חומרי הפיטום. וכתוצאה מכך היה משקל הגוף של קבוצת הניסוי קטן ב-33.4 ק"ג ממשקל קבוצת ההיקש (קבוצת הביקורת).

▲ פר, הידוע במזגו הנוח, השתולל לפתע ופרץ את מכלאת המרעה שלו ליד פראזו בקליפורניה והסתער על מכונית נוסעים מתקרבת. אחר ההתנגשות בין הפר ובין המכונית חובר שבעל המכונית הינו רופא וואטרינארי, המנהל את המכון לחזרעה מלאכותית לכל משקי החלב באיזור. (הוצעק מהמדור „ראיתי שמעתי“ מעיתון „הארץ“)

▲ באוניברסיטת איובה (ארה"ב) נערך מחקר בשאלת הסאלאקציה בבקר חלב לגבי יעילות הנצילות של מזונות בייצור חלב. מסקנת החוקר היא שאמנם הסאלאקציה לתכונה זו עשויה להיות אפקטיבית. ברם, נתגלתה קוראלאציה (מיתאם) גאנאטית בשיעור גבוה בין תנובת החלב וכוסר ניצול יעיל של המזון, והתורשתיות לגבי שתי התכונות הן כמעט שוות (תואמות). היוצא מזה שסאלאקציה להנבה טובה וגבוהה תביא ממילא ליעילות ניצול המזון (עד כדי 70%-95%).