

מבחן צאצאי הפרים בדנמרק

בשנת 1966/67 נבחנו צאצאיהם של 77 פרים ב-25 תחנות מבחן. בתקופת החורף ניזונו הפרות (מבכירות) בהתאם לנומרות המקובלות בהזנה ברפת, ובקיץ — בהתאם לטיב המרעה, בו רעו הבהמות. התנובה הממוצעת של הגזעים השונים היתה כדלקמן:

הגזע	מס. קבוצות	מס. המבכירות	חלב ק"ג	שומן %	שומן ק"ג	חלבון %	חלבון ק"ג
אדום-דני	40	732	5053	4.52	228.38	3.80	192
ג'ארסי	16	300	3613	6.55	236.79	4.32	156
שחור-לבן דני	21	398	5206	4.32	224.78	3.65	190
ס"ה (וממוצע)	77	1430	4796	4.78	229.15	3.84	184

תנובת השומן בממוצע היתה הפעם ב-2 ק"ג גדולה מזו שבשנה שעברה. הג'ארסיות גם הפעם הצטיינו בתנובות שומן הגדולות ביותר. תנובת החלבון הגדולה ביותר הושגה בגזע הדני-אדום. הקבוצות המצטיינות שבכל גזע הניבו תנובות דלהלן:

הגזע	שם הפר הנבחן	מס. המבכירות	חלב ק"ג	שומן %	שומן ק"ג	חלבון %	חלבון ק"ג
אדום-דני	אובה *	16	6427	4.69	301.32	3.82	246
שחור-לבן דני	ווארדה סטאפאן	20	5630	4.47	251.70	3.63	204
ג'ארסי	בורנהולמס בריגר	16	4061	6.51	264.30	4.24	172

* התצורות הממוצעת של בנות "אובה", ב-304 ימים הסתכמה ב-4348 יח"מ, בכלל זה 1889 יח"מ במזון מרוכז והשאר — מספוא גס ומרעה.

הועתק מ-Afkomsprover med tyre XXII ע"י י. ע.

