

מאה ועשרה וולדות ממאה אמהות

שויות להתייחס באותו יום. כן אני מפרסם באוזני העובדים והחולבות את שמות ומספרי הפרות ומבקש אותם להסתכל באותן הפרות כדי לגלות סימני התייחמות. אם הם מגלים התייחמות באחת הפרות, הם מביאים אותה לתחנת ההורעה שבמשקנו (במיבנה מיוחד) ; אני בודק את הפרות ובשעת הצורך הנני מזריע אותן.

יקרה כמובן שאחת הפרות, נניח — פרה מס' 200, לא התייחמה ביום ה-19 בינואר, אזי אני מעביר את כרטיסה לכיסון של יום 20 בינאר; "טלטול" כזה של כרטיס הפרה, מהיום ליום המחרת, עלול להימשך לפעמים כ-10 ימים עד שמגלים את ההתייחמות ומזריעים את הפרה הזו. אם פרה אינה מתייחמת כעבור 10 ימים מתאריך ההתייחמות תצפיות, כלומר — כעבור 28 ימים מההמלטה, הרי מעביר אני את כרטיסה לכיסון מיוחד המיועד לרופא; הוא בודק אותה פרה מיד, קובע את סיבת אי-ההתייחמות ומתחיל בריפוי.

את תאריך ההורעה הנני רושם באותו כרטיס והנני שם אותו בכיסון הנושא את התאריך של יום שלאחר ההורעה. כך, למשל, אם הפרה 200 הורעה ב-25 בינואר, אזי את כרטיסה אני שם בכיסון של 12 בפברואר; אם מתברר שהיא לא נתעברה ומתייחמת שוב, הנני מנזיע אותה שנית בתקופה שבין 13 ל-23 בפברואר, ואם קורה שאותה פרה לא מתייחמת — לא ב-13, לא ב-14 ולא ב-18 בפברואר, הריני מסיק מזה שהיא התעברה מההורעה הראשונה. אם הורעתי אותה שנית, אני שוב רושם את התאריך בכרטיסה ולאחר הוספת 18 יום לתאריך הורעה זו, מוכנס הכרטיס שלה לכיסון מתאים כדי לבדוק שוב כעבור 18 יום אם היא מתייחמת או שנית עברה. כך אני נוהג גם אחרי הורעה שלישית.

הכרטיסים של הפרות שנתעברו, אני שם לתוך תיבה מיוחדת, המחולקת על ידי מחיצות לפי חודשי השנה. במדור של כל חודש שבתבינה זו מרוכזים הכרטיסים של אותן הפרות שעומדות להמליט באותו חודש. סידור פשוט זה מקל על

בסובבך שלנו אין אנו נזקקים לפריירביעה זה 6 שנים ומספרים את פרותינו בהורעה מלא-כותית בלבד. בשנת 1961 הביאו לנו 100 אמהות 108 וולדות, ב-1962 — 110, ב-1963 — 103, וב-1964 קיבלנו מכל 100 אמהות 110 וולדות. כיצד אנו משיגים זאת? כ-10% מהפרות יולדות פעם שניה באותה שנה. כך, למשל, פרות שהמר ליטן בינואר, הורעו בדרישתן הראשונה, כלומר — בפברואר, והן המליטו בנובמבר.

אנו מקיימים פיקוח קפדני על כל הפרות. כשהפרה "חוזרת" לא נתעברה לאחר ההורעה ראשונה, אנו עוזרים לה שטיפה (הזלה) בתמיסה פיזיולוגית, כ-30-40 דקה לפני ההורעה. לפני זה היא נבדקת על ידי הרופא ובהתאם לממצאיו ניתן לה הריפוי המתאים. אני משתמש גם בשמן גליצרין מתובל בפאניצילין לטיפול בפרות חוזרות. את התמיסה הזו אני מכין כך: אני לוקח צנצנת עם מעט פאניצילין, ממלא אותה מלא-מלא בשמן גליצרין, בוחש וטורף ומעמיד את הצנצנת במקום חם למשך 2-1 יממות, עד להמסה מוחלטת. תוך בחישה מדי פעם; התוצאות שהשיגתי הן מצויינות.

במשק שלנו מאורגן בצורה תכליתית ביותר רישום ומיפקד כל פעולות ההורעה. כידוע, מריפוע ההתייחמות כעבור 18-29 יום מהלידה, ואצל פרות שהורעו ולא נתעברו, היא עתידה להופיע כעבור 18-21 יום. כדי לפקח טוב יותר על ההורעה סידרתי לעצמי כעין לוח מיוחד, כמתאר להלן: תפרתי 32 כיסונים על שעונית. בכל יום, לפנות-ערב, אני מקבל הודעות מהבריגאדיר (רכז הרפת) ומתחולבות רשימה של הפרות שהמליטו באותו יום. אני רושם תאריך ההמלטה על כרטיס מיוחד של אותה פרה ומכניס אותו לכיסון, עליו רושם התאריך של ההתייחמות הצפויה (כעבור 18 יום מתאריך הלידה). כך, למשל, הפרות, הנושאות את המספרים 100, 150 ו-200 המליטו ב-1 בינואר; את כרטיסיהן אני טומן בכיסון ה-20 המציין את התאריך 19 של חודש ינואר. כשאני בודק את הכיסון ב-19 בינואר אני יוצא לרפת ומסתכל היטב בכל הפרות ש-

לתוצאות הטובות. הניסיון המוצלח שלנו בחי-
סול איזומתעברות יובא לידיעת שאר המשקים
וגם אצלם יונהג פיקוח ורישום לפי השיטה שלנו.
ב. מאבקובח

טכנאי-מזרע בסובחח ואלארינסקי (סיביר)

(מתוך "מולוצ'נייה" מ'אסנויה סקוטובודסטבו", חו-
ברת פברואר 1965).

העובדים להתמצא בהמלטות של כל חדרש
חדש.

במשקנו חוסלה איזההתעברות לחלוטין. מובן
מאליו שאני המשמש כמזרע, לא הייתי מצליח
יחידי להשתלט על כל הבעיה של הפראת הפרות
בצורה תקינה, אבל עומדים לצדי ולעזרתי כל
שאר העובדים והחולבות. הודות לכך הגענו

חקלאי זכור! המסכנא דורש גם אשלא

מחקרים הכיח את יעילותו של הדישון האשלאני
במספא אפילו בקרקעות כבדים.
להלן ההמלצות לדישון שניתנו ע"י המד למספא.
שרות ההדרכה והסקצות (נ.ה.מ.).
משרד החקלאות.
(הנחית לעשה במספא. אביבקיץ 66)

תירס לירק בענה האכפאצית

40-50 ק"ג/ד אשלאני-כלורי.
הסכנא בביד השמק ביוזר לפי הדיעה.

תירס לאשכארים וקלחים

40-50 ק"ג/ד אשלאני-כלורי.
חיוני לתירס חסוק פורס לעסק ביוזרשן ושקדירדן.



תירס

40 ק"ג/ד אשלאני-כלורי.

בגלל הכפואת הנורלות של דשן חקקי הניתנות לסרעה,
רצוי לפנות לשירות-השדה לעם בדיקת קרקע
לתכונת אשלאני.



עשב רודס וכספלו

אסכסת קייאח

40 ק"ג/ד אשלאני-כלורי. החל מהשנה השנייה.
אם לא ניתן זרחן בודיעה מוסיפים 40 ק"ג/ד
סופרפוספס רזיל. יחד עם האשלאני.

כמהאססת חסה ואפסוד לעלות על השמח.

הכמת שפודים לקראת זריעת סתיו

יש להתחיל את המיפול ביולי. להשקות עד לשמק 30 ס"מ
ולאחר שבועיים בפרם אם השמח.

אזכר לפד 100 ק"ג/ד סופרפוספס וזוד

50 ק"ג/ד אשלאני-כלורי. ממועים כחרישה סורה

ובמחרשה מתהפכת עד 30 ס"מ שמק.



אסכסת

ראו בסעד לסלאי של אשלאני-כלורי במחסוק.
הסוכנים לרשן אשלאני: "המשכיר המרכזי וחברת "עסיר".

מפעלי ים הפלח בע"מ

יעין והדרכה: המחלקה החקלאית.
משרד תר"אכ"ב תר. 3461. 5714.

