



הוראות השירותים הווטרינאריים למדגריות ומשקי רביה של אווזים

(חוזר מס' 70/3)

בזמן האחרון נקבעו מספר מקרים של מחלת הסלמונלוזיס באווזים שנגרמו עקב אי-הקפדה על כללי הסאניטאציה בביצי ההדגרה ובמדגריה. מחלה זו עלולה לסכן את הייצוא של כבד האווז ואת קיומו של הענף.

במאמצים למלחמה במחלת הסלמונלוזיס ובהתאם ל"צו בדבר הקמת מדגריות והפעלתן תשכ"ז — 1967" ו"צו בדבר הקמת והפעלת משקי רביה ומשקי טיפוח תשכ"ז — 1967" חובה על המדגריות ועל משקי רביה של אווזים להקפיד על התנאים הבאים:

1. המדגריה חייבת להצטייד ברשיון מאת מנהל השירותים הווטרינאריים ולפעול בהתאם לתנאים המפורטים בגוף הרשיון.

2. במשקי הרביה יעברו ביצי הדגירה את הטיפול הבא:

- (א) מיד לאחר כל איסוף יש לאייד את הביצים במשך שעה אחת (ראה 4 להלן);
- (ב) לאחר האייד יועברו הביצים לחדר מיוחד לניקוי ורחיצה (ראה 5 להלן);
- (ג) לאחר הרחיצה יש לאייד את הביצים שנית במשך שעה אחת ולהחזיקן בנפרד;
- (ד) הביצים יועברו למדגריות באריזה חדשה או מחוטאת;
- (ה) ינוהל רישום מדויק של יעד ביצי הדגירה.

3. במדגריה יבוצעו הפעולות הבאות:

- (א) הביצים יאויידו במשך 20-30 דקות מיד עם קבלתן ופעם נוספת מיד לאחר הכנסתן למדגרה.
- (ב) אחרי גמר כל בקיעה יש לנקות המדגרה על כל מיתקניה באופן יסודי, על ידי רחיצה בתמיסת סבון או חומר מנקה דטרגנטי, שיפשוף במברשת קשה ושטיפה בזרם מים חזק.
- (ג) כל פסולת ושיירים יש לאסוף מיד לתוך מיכלים הניתנים לסגירה ולהעבירם לפחי אשפה ומשם לבור רקב או משרפה.
- (ד) לאחר ביצוע הניקוי יש לחטא את החדרים, הרצפות, הקירות והציוד בחומרי חיטוי מקבוצת הפאנולים (ליזול 5%) או בחומר חיטוי השייך לקבוצת האמוניות רבועי בריכוז של 1% חומר פעיל.
- (ה) את תאי הבקיעה יש לאייד בין כל בקיעה ובקיעה במשך 24 שעות כשהם ריקים, לאחר ניקוי יסודי של פנים התא ולאחר החזרת המגירות הרחוצות למקומן.

(ו) מכל בקיעה יישלחו מדי שבוע 25 אווזונים פסולים לבדיקה למעבדה ממשלתית למחלות עופות באיזור.

(ז) ינוהל רישום מדויק של מקור ביצי הדגירה ויעד האווזונים מכל בקיעה
4. ביצוע האידויים :

(א) האידוי יעשה על ידי הפקת גז פורמאלדהיד במקום אטום (חדר או תא).

(ב) מפיקים גז פורמאלדהיד ע"י הפעלת פורמאלין על קאלי-פרמאנגאנט או ע"י חימום אבקת פאראפורמאלדהיד (פורמאלין). כשהאידוי נעשה על ידי פורמאלין עם קאלי משתמשים ב-53 סמ"ק פורמאלין (37%-40%) ו-35 גרם קאלי לכל מטר מעוקב (יוצקים את הפורמאלין על הקאלי בכלי אמייל שקיבולו גדול פי 10 מנפח החומרים המשמשים לאידוי); כאשר משתמשים באבקת פורמאלין להפקת הגז, הכמות היא 13,5 גרם של אבקה למטר מעוקב.

(ג) קיבול מקום האידוי יותאם למספר הביצים.

(ד) הטמפרטורה במקום האידוי תעלה על 20 מ"צ והלחות היחסית תהיה מעל ל-60% במזג אויר יבש. (רצוי להוסיף לחות במקום בעזרת כלי שטוח, מלא מים).

(ה) בזמן האידויים יימצאו הביצים בסלים מרושתים או בתבניות פלאסטיות או על מדפים עשויים רשת כדי שתתאפשר זרימה חופשית של האויר וחישוף הביצים לגז הפורמאלדהיד.

5. ביצוע הניקוי ורחיצת ביצי האווזים :

(א) קליפות הביצים יוקו באופן מכאני מליכלוך גס.

(ב) הביצים כשהן נתונות בתוך סל או דלי מרושת, יוטבלו בתמיסה של קאלי פרמאנגאנט 0.5%-1% צינק-סולפאט 1% במשך 5 דקות.

(ג) הטמפרטורה של התמיסה במשך זמן הטבילה תהיה 30-35 מ"צ.

(ד) לאחר טבילת 250 ביצים יש להחליף את תמיסת החיטוי.

(ה) לאחר הטבילה יש לרחוץ את הביצים עם זרם מים פושרים בטמפרטורה של 30-35 מ"צ

(אין לנגב או לרחוץ את הביצים במטלית).

בעלי מדגירות ומשקי רביה של אווזים, שימרו על ההוראות למען מניעת הופעת מחלות וקיום

החוק !

השירותים הווטרינאריים



גם טיפולים „קלי-ערך“ כאלה עשויים לסייע בשמירת בריאות הבהמות