

האסיפה בחרה בהנהלה בת 25 שחבריה הם:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. אילי אלקס — בית-שערים | 14. נורי זאב — כ. גליקסון |
| 2. בן-צבי יאיר — כ. יחזקאל | 15. סגל י. — ציפורי |
| 3. ברזלי א. — מינהל הדרכה | 16. פלסר חנוך — שדה-אליהו |
| 4. גור משה — היוגב | 17. פסח אסף — דגניה ב' |
| 5. גלעד אורי — בית-יצחק | 18. צביק גילה — בית-השיטה |
| 6. גבע יוסף — עובד "און" | 19. קליין אברהם — כ. מונש |
| 7. גרטמן יואב — יגור | 20. רכלבסקי ח. — נהלל |
| 8. דורי שלמה — יפעת | 21. רוזנבליט י. — גניגר |
| 9. הימן משה — עין-חרוד, מ. | 22. שדמי נ. — שער-העמקים |
| 10. זינגר ברוך — גשר | 23. שלו י. — מושב מרחביה |
| 11. יעקבסון ח. — חפצי-בה | 24. שוויצר ח. — כ. ויתקין |
| 12. כהן יוסף — גן-שמואל | 25. שדמון רפי — הזורע |
| 13. מירז שמואל — כ. יהושע | |

לוועדת הביקורת נבחרו:

1. גל זאב — עין-המפרץ
2. סולניק צבי — בית-אלפא
3. רוזן אברהם — כ. יהושע

לוועדת הטיפוח נבחרו:

1. ד"ר אייל י. — "החקלאית"
2. בר-ענן ר. — משרד החקלאות
3. גולן איתן — כ. ויתקין
4. הימן מ. — "און"
5. כ"ץ מ. — שלוחות
6. לנדסברג פ. — כ. ידידיה
7. פלד א. — עין-חרוד, מ.
8. צמרי עזרא — מרחביה, קיבוץ
9. צנטנר מ. — שריד
10. רבינ' שבתי — "און"
11. שלח איתן — מזרע

הובא לדפוס ע"י —

הנהלת "און"

▲ אין חדלים לחקור בשאלת השפעת חודש או עונת ההמלטה על התנובה. בזמן האחרון פורסמו תוצאות המחקר שנערך לגבי 6846 מבכירות פריזיות שהוחזקו ב-672 עדרים. האנגליה ובוואלס במשך השנה שנשתיימה ב-30 בספטמבר ב-1968. בסיכום נאמר שהתנובות התקופתיות מעונת אוקטובר-דצמבר הן הגבוהות יותר ולעומתן — התנובות מהמלטות מאי-יוני נתגלו כנמוכות ביותר. בארץ, טרם נערכו מחקרים יסודיים בשאלה זו ובקרב בוקרינו, "מתהלכות" רק שמועות על הפסדים כדי 500 ק"ג חלב בתנובות הפרות שממליטות בעונת הקיץ. בשנים האחרונות, כשמיבחן הפרים מתבסס בארץ על יסוד תנובות של בנותיהם (ובנות-זמנן) שהמליטו בחודשי השנה השונים הרי יש חשיבות מיוחדת בגילוי "מפתח", או "מקדם" לשם התאמה ותיקון התנובות שנתקבלו מהמלטות בחודשי השנה השונים, כי בלעדי תיקון כזה, עלולות להסתלק תוצאות המיבחן של הפר.

▲ על חשיבות המינראלים במנת-המזון לגבי פוריות הפרות נכתב לא פעם. המחקרים הבעייה זו אינם פוסקים. בזמן האחרון נתפרסמו המלצות אלה לגבי חשיבות המינראלים בפוריות הבקר: היחס האופטימאלי בין סידן לזרחן הוא 1:2; היחס הרצוי בין זרחן לחלבון כללי נעל במנת-המזון הוא — 3.5 עד 3.9 גרם זרחן לכל 100 גרם חלבון כללי נעל; חסר בנתרן וגודש האשלגן משפיעים רע מאוד על הפוריות; המאנגנאן הוא בעל חשיבות רבה בפוריות, ואם הוא יחסר לחלוטין במנת-המזון, עלול הדבר להביא לעקרות מוחלטת; גם המחסור בנחושת ואבץ (צינק) עלול לפגוע בפוריות; יוד דרוש לשם שמירה על תקינות התיפקודים המיניים ומחסורו במנת-המזון פוגע בפוריות.