

נזקי הטלפים בבקר והטיפול בהם



תמונה מס' 2 — התהוות סוליה כפולה בטיפול בלתי מספיק בטלפים

מחודדים (עמדה קצרה, מפצמות, דרך זרועה אב-נים), מהווים סיבה ראשונית לתחלואה בטלפים, ובטיפול גרוע השפעתם של הגורמים מקדמת את גורמי המחלה.




תמונה מס' 3 — הטלף גדל ס"מ אחד, בערך, בחודש, 50%, בערך, נשחקים עם ההליכה, השאר צריך להיחתך אחת ל-8—9 חודשים

שאלת הטיפול בטלפי הבקר לא מצאה עדיין את סידורה הרצוי בעדרי הבקר שלנו, בישראל. טרם חזרה תודעת הצורך בטיפול מתמיד בטלפים והכרת הנזק שנגרם לבהמה ולבעליה מחוסר טיפול סדיר.

סדנא דארעא חד הוא — על חוסר טיפול, או טיפול בלתי מספיק בטלפים דנים שני מאמרים ב-Tierzuechter, מס' 8, אפריל 1971, פרופ' M. Stoeber ומר Brodersen, ואני מביא בזה בתרגום חופשי תמצית מדבריהם.

לפי ממצאי סקרים בארצות אירופה אחדות, מהוות מחלות רגליים בבקר 5%—10% מכלל



תמונה מס' 1 — טלפי „נעלי-בית“, המשתברים בקשת הנשיאה

המחלות. כשלושה רבעים ממקרי התחלואה ברגליים נגרמים, בעיקר, מנזקים וסבל בטלפים. ה-בוקרים אינם מחשיבים עדיין במידה מספקת את הנזק לפרה וההפסד בהכנסה לבעליה, שגורם חוסר טיפול, או טיפול בלתי מספיק בטלפי ה-פרות. טלפים שניזוקו גורמים כאבים לבהמה ובעקבותיהם באה הפחתה בתנובה, כדי 500 ק"ג חלב ו-100 ק"ג בשר בשנה. נזק או הפסד כזה אף משק אינו יכול להרשות לעצמו. ותמוה הדבר, כי הטיפול בטלפים קל למעשה.

הגורמים המזיקים לטלפים, כגון: עמידה או הליכה תמידית בכלוך לח (שכבת זבל, תעלה שתן, מרעה רטוב), או על קרקעית קשה וקצוות

גורמים מכבידים מאוד, אנורמליים (לחצים, גירוי-יים), ותהליכים הרסניים (ריכוך וריקבון), כפעולות בלאי הרסניות. הם גורמים לבסוף להתהוות מוגלתית וחידקים ממיתי הרקמה של פנים קרן-המגן, החלק הרגיש ביותר של הטלף.

כשהטלפים ארוכים מדי, עובר עומס המשא של הגוף — 100—150 ק"ג של כל רגל — אחורה, כי אצל הבקר הגוף נשען בעמידה ובדריכה על בהונות האצבעות. זה מזיק לפרקים, לרקמה החיבורית ולגידים של הרגל כולה. הגוף נישא על גדות הטלף — היא הקשת מסביב. ובקרן הסוליה הבלתי מטולפת, בלתי חתוכה, מתהווה דלקת, כתוצאה מלחץ מתמיד של כובד הגוף על הסוליה. כאמור, הבהמות סובלות כאבים חזקים ותנובתן פוחתת במידה ניכרת. כדי להקל על העבודה ישנם אמצעי עזר טכניים, כמו העמדה המיוחדת לטיפול ב"טלפים. הטיפול מהיר יותר ונעשה מתוך בטיחות בעבודה במכשיר זה.

הטיפול בטלפים אינו קשור בעונה מסוימת בשנה. אפשר לעשות זאת ברפת וגם במרעה, בחצר. החשוב הוא טיפול סדיר ומתמיד, שיעשה מדי 8—9 חודשים.

התמונות: מס' 4 של ברודרסן, ושאר ה"3 מה"קליניקה לטיפול בטלפים, באוניברסיטת הנובר. תורגם ותומצת ע"י ח. ע.

הטלף גדל סנטימטר אחד, בערך, בחודש. כ"50% מזה נשחקים תוך הליכה במרעה, בחיפוש אחרי המזון (מקובל, שהבהמה במרעה נמצאת כ-8 שעות ביממה על הרגליים), והשאר צריך להיחתך מזמן לזמן. יש להניח, שאצלנו בסככה ובחצר הטלפים משתחקים פחות, והם זקוקים לטיפול תכוף יותר.

בטלף ארוך יתר על המידה, שהשתנה בצורתו בקשת הנשיאה (נשיאת הגוף נשענת על קצה הטלף בקשת מסביב, המת') הסוליה או הכרית הכדורית (על כף הדריכה, המת'), כשהקרן לרוב גם היא מקורצפת בטלף הבלתי מטופל, פועלים



תמונה מס' 4 — עמדה ניידת מקלה על העבודה ויכולה להיעשות בכל מקום

בשוק הבקר בשר

ההספקה והתצרוכת

בשנת תש"ל נשחטו בבתי המטבחים השונים בארץ 79,740 בקר, במשקל חי של 31,053 טונה, לפי הפירוט הבא:

פרות ומבכירות	19,247
עגלים ושוורים	42,235
בני בקר	13,063
בקר מקומי, ערבי	5,012
בקר ייבוא	183
סה"כ	79,740

עם פרסום קבע של מדור זה על מחירי הבקר בשר במכרזים, שנערכים מדי יום שלישי בשבוע ע"י „המועצה לייצור ושיווק בקר וצאן לבשר“, אני חושב לנכון למסור לעיתים קצת מידע והסבר על המתרחש בשוק. הפעם על ההספקה והתצרוכת בבשר בשנת תש"ל ותופעת הפער הגדול במחירים, כפי שאנו רואים בטבלת השיווק ה"מצורפת" (מקורם של הדברים הבאים להלן מה"מועצה הנ"ל).