

לקט מספרות מקצועית

פוריה

1. בסוריה ישנם כיום 523,000 בקר, 5.42 מיליון כבשים ו־83,000 עזים. 57% של הבשר הנצרך ו־70% של החלב מספק הצאן, ו־28% בשר ו־15% חלב — באים מן הבקר. 25,000 בקר הם מהגזע הדמשקאי (במקור — שמי).
- לסוריה הובא גם בקר פריזי־דני, חום שויצי ואנגוס (בקר אדום) למטרות השבחה.
- 500 פרות ייבוא פריזיות הניבו בממוצע שנתי, במשך 3 שנים, 3,666 ק"ג חלב ב־333 ימים, בתנודה בין 683 ל־8,399 ק"ג חלב.
- אורך הזמן בין המלטה למשניה מגיע בממוצע ל־416 יום בתנודה בין 370 ל־702 יום.
- מדי שנה מוזרעות כ־1,000 פרות.

בריה"מ

2. ב־1.1.66 היו בבריה"מ 97.1 מיליון בקר. 17 מיליון מאלה בבעלות הפועלים החקלאיים ויתרם במשקים ממשלתיים וקולחוזים. תנובת חלב ממוצעת לפרה בשנה — 2,130 ק"ג.
- עגלים נשחטים בגיל 14—18 חודשים במשקל 300—400 ק"ג.
- עגלים מסורסים מגזע סימנטל, בגיל 443—446 יום, שקלו 391—408 ק"ג.
- נצילות מזון 6.72—6.92, תפוקה, 58.84%—59.2%.

פולין

3. תנובות חלב של פרות שרולה בפולין היו בממוצע 1,208 ק"ג עם 4.7% שומן בהמלטה ראשונה ובשניה 1,723 ק"ג עם 4.47%, שומן הנווה 812—2,121 ק"ג.
4. 10 ראשי בקר מגזע לימוזין ו־10 מגזע גרון (אקיטן בלונד) במשקל 212 ו־214 ק"ג — בהתאם, פוטמו במשך 5—9 חודשים ל־418 ו־421 ק"ג. תוספת משקל יומית היתה 1.38 לשני הגזעים. נצילות המזון — 7.44 ו־7.56 יחידות מזון לייצור ק"ג תוספת. % התפוקה היה 62.1 ו־62.8. לא היו הבדלים מהותיים בטיב הבשר.
5. בחינת השפעת הסירוס, בגיל 2 חודשים, אשר בוצעה ב־10 זוגות תאומים זהוב בשתי קבוצות, היו התוצאות כדלהלן :
- בקבוצה 1 — קיבלו העגלים התמימים הונה חופשית והמסורסים מוגבלת, בקבוצה 2 עמדו כולם בהזנה חופשית.

קבוצה 2		קבוצה 1		
מסורסים	תמימים	מסורסים	תמימים	
455	455	455	455	משקל שחיטה, ק"ג
863	721	888	735	תוספת משקל, גר'
51.7	52	51.7	52	% תפוקה
4.46	5.64	4.73	5.04	יח"מ/ק"ג תוספת

בכל המקרים היו המסורסים שמנים יותר.

6. בניתוח תהליך של 3,433 המלטות נתקבלו תוצאות כדלהלן :

שרולה פריזי	שרולה ג'רזי	הרפורד פריזי
7.7	4.9	4.7
5.7	5.7	4.9
% תמותת ולדות בלידה		
הפסד עד 12 שבועות		

7. השפעת משקל הגמילה על יעילות ייצור הבשר. 3 קבוצות של בני מכלוא הרפורד אפריקנדו קיבלו מגיל שבועיים, במשך 6 חודשים, 3 רמות הזנה ונגמלו במשקלות כדלהלן :

רמת הזנה דלה	92 ק"ג
רמת הזנה בינונית	135 ק"ג
רמת הזנה עשירה	188 ק"ג
אין פרטים על סוג המזון.	

לאחר הגמילה קיבלו כולם אותו טיפול ונשחטו בגיל 32 חודש, בערך. לאחר הגמילה, בטיפול השווה, גדלו העגלים בהזנה הדלה והבינונית מהר, ובזמן השחיטה היה ההפרש ביניהם 1.5 ק"ג בלבד. נצילות המזון היתה הטובה ביותר בקבוצה של רמת ההזנה הדלה. בגיל 32 חודש שקלו העגלים כדלהלן : 530, 535, 562 ק"ג, בהתאם. העגלים צרכו לייצור ס"ה מזון במשקל כדלהלן : 11 ק"ג, 14.6 ק"ג ו-17.4 ק"ג. אחוז התפוקה היה 57%, 56% ו-56.2%, בהתאם. ההבדל היחידי היה שעגלי רמת ההזנה העשירה הגיעו הראשונים למשקל של 450 ק"ג. תוספת לאחר הגמילה 438—400—374 ק"ג, בהתאם. תוספת יומית לאחר הגמילה 560—512—490 גר'. משקל 450 ק"ג גיל ימים, 780 ימי הזנה.

בגיל 6 חודשים	92	135	188
התוספת עד 450 ק"ג	358	315	262
הגיל בימים בהגיעו ל-450 ק"ג	653	615	535
גיל ב-400 ק"ג	833	795	715
	+118	+80	

ליקט פפר משה, שה"מ

מחוסר מקום לא התפרסם הפעם המדור „בהתאחדות“, אשר כלל :

דברי המזכירות על־ידי שלמה דורי, דוחות מועדות איזורים, ונוסף על אלה : דברי הח"ת ש. ידידיה ובן עמי בקשר למיזוג אגודות ההזרעה, מכתבו של ד"ר אילון על „עגל שדיך“ ולקט ספרותי של ח.ע.

החומר יפורסם בחוברת הבאה ועם המחברים הסליחה.

המערכת