

בשינויי המחירים האחרונים עלה מחיר הסו- בין ב-15.5% בלבד בהשוואה ל-18.5% בגרג- רים, הפער בין מחירי הסובין והגרגרים גדל עוד לטובת הסובין, וכתוצאה מזה גבר הלחץ לצריכת סובין מעל הכמות המצויה בארץ. השינוי האחר- רון במחירים החריף את המצב הקיים, במקום לנצלו לתיקונו. זה יגרום שוב לשוק שחור בסובי חיטה מצד אחד, ודרישות מוגברות לייבוא סובין מצד שני.

סיכום

השינוי במחירי המספוא, שבא בעקבות הפיחות במטבע, געשה באופן מיכני, ללא התחשבות ב- מחירי המספוא בחו"ל ובתנאי השוק בארץ. היה רצוי לתקן את המצב, וכתוצאה גם המדינה וגם החקלאים היו נשכרים.

בנימין לב

האגף לבעלי-חיים, שה"מ

עם שינויי המחירים (לפי הטבלה לעיל) צריך היה לקבוע את גרגרי השעורה גם אצלנו, כגרג- גרים הזולים ביותר. קביעה זאת היתה מצמצמת את השימוש בגרגרי מילו בתערובות בקר ובמ- קומם היו מגדילים את השימוש בגרגרי שעורה. המדינה היתה נשכרת בחיסכון הוצאות הייבוא על גרגרים יקרים יותר, והרפת לבטח היתה נהנית, כי גרגרי השעורה עדיפים לבקר על המילו.

מחיר סובי החיטה

כמות הסובין בארץ מצומצמת. הכמות הנוצרת יכולה לספק את צרכי מעלי הגירה (כ-85,000 טון) ולהותיר עודף מסוים. בתנאי המחירים בעבר כדאי היה להשתמש בכמויות סובין מעל הצרכים המינימאליים בתערובות מעלי גירה. ואף כדאי היה להשתמש בסובין בתערובות של בעלי חיים אחרים, והוא אשר גרם לצורך בייבוא סובין מחד, ושוק פרוע ואף שוק שחור מאידך.

פסולת כותנה להזנת בקר

לפי נתוני מוריסון, כלל החומרים הנעכלים בפסולת כותנה נע בין 37% ל-44%, בהשוואה לקש חיטה או שעורה — 43%. בהתחשב בתכולה הגבוהה יותר של האפר אצלנו, הערך המזין נמוך בכ-15%, מהחישוב שאצל מוריסון.

מכל האמור לעיל, גראה, שהערך המזין של פסולת הכותנה משתווה ואפילו פחות מן הערך המזין של קש חיטה או שעורה. כן יש להניח, שתהליך הכנת החומר בצורת כופתיות, פוגע בתכונותיו כמזון גס, כי רק בתור שכזה המטרה העיקרית באביסת פסולת הכותנה.

עופר קרול, בנימין לב

מספר מנפטות הופיעו לאחרונה בהצעות מכי- רה של פסולת כותנה בצורת כופתיות או רקי- קים. אין עדיין נתונים על ניסויים וניסיון בהזנה בחומר זה בארץ, ואנחנו מתבססים בינתיים על נתונים מחו"ל.

בדיקה כימית של כופתיות פסולת הכותנה מראה על תכולה של כ-20% אפר, בעוד שחומר דומה בחו"ל מכיל רק כ-5%—6%. יש להניח שעפר רב מעורב בחומר המקומי. אשר לחלבון, בחומר המקומי מגיעה התכולה לכ-10% חלבון כללי. מהנתונים שברשותנו נמ- צא, שמקדם העיכול של החלבון נע בין 0 עד לכ-26 אחוזים. סביר להניח, שהחומר מכיל במוצע כ-2% חלבון כללי נעכל.