

תלות הפוריות באחוז השומן בחלב

בהקשר לפרסומים שרבו לאחרונה מעל דפי פוריות טובה יותר, מצאתי לנכון להביא בזה בטאונגו על הקורלציה בין שומן גמוך בחלב עם רשימת אחוזי השומן וההתעברות במשקנו, קיבוץ פוריות לקויה, ולהיפך — שומן גבוה יותר עם גבולות.

מצב ההתעברות ואחוז השומן לפי חודשי השנה

החודש	תשל"א — 70/71		תשל"ב — 71/72	
	% השומן	% ההתעברות	% השומן	% ההתעברות
אוקטובר 1970	3.2	60	3	68
נובמבר	3.1	50	3.10	68
דצמבר	2.5	68	3	62
ינואר 1971	2.8	65	3.2	50
פברואר	2.8	48	3	61
מארס	2.7	57	3	65
אפריל	2.9	55		
מאי	2.7	63		
יוני	3	60		
יולי	3.10	60		
אוגוסט	3	56		
ספטמבר	3	58		

ייתכן, שמימשק נכון וצוות מקצועי טוב עשויים לתקן את המצב בשני המקרים. כידוע, את אחוז השומן בחלב תולים בחלקו של המזון המשקי במנתה של הפרה החולבת, והוא אשר במשקנו: אספסת ירוקה בערך של 1.5 יח"מ, תחמיץ תירס בערך של 1.5 יח"מ, שחת בקייה בערך של 1.0 יח"מ. בתקופה שאין תחמיץ תירס, הוא מוחלף בקלי-פות פרי-הדר וירקות (במשך חודשיים). העגלות ניזונות רק בקש ומזון מרוכז. גיפני, קיבוץ גבולות

במאמרים מייחסים את אחוז השומן הנמוך בחלב והתעברות לקויה למשק הקיבוצי, בעיקר. אבל אין להשוות בכ"ז את הרפת במשק הקיבוצי לזו שבמשק המשפחתי. הרפת בקיבוץ גדולה לאין ערוך מהרפת המושבית, תנאי ההזנה ועבור דה אחרים והתנזרות גבוהות יותר. אמנם הרפת במשקנו איננה מן הגדולות ביותר, אבל גדולה עכ"פ מאשר במושבי-משפחתי. אינני מאו-שר, כמובן, מאחוז השומן הנמוך בחלב שלנו, אבל הוא איננו קשור כלל במצב ההתעברות. (אגב, מדוע הבוקרים ונציגיהם בהתאחדות אינם עושים לשינוי תשלום הקנסות בעד שומן חסר?).