


בריאות



הודעות השרותים הווטרינריים

מחלת ההפלה המדבקת (ברוצלוזיס) בבקר

לאחר קום המדינה הגהיגו השרותים הווטרינריים חיסון בתרכיב, הקרוי „זון 19“ (תחילה לכל הבקר ואח"כ לעגלות צעירות בלבד). אח"כ הוחל גם בבדיקות חלב שיטתיות מלוות, לפי הצורך, בבדיקות דם, לגילוי פרות מגיבות בודדות לשם חיסולן.

הודות לאמצעים אלה פחתה המחלה עד שנעלמה מעדרי הבקר לחלב והיתה נדירה גם בעדרי הבקר לבשר. בבקר המקומי, שבכפרי המיעוטים, לא שררה המחלה והוחלט, מטעמים מקצועיים, שלא לחסנו אלא לערוך בו בדיקות דם במידת האפשר.

לפני יותר משנה פרצה המחלה, מלווה סערת הפלות, בבקר מקומי, באחד מכפרי המיעוטים באזור נצרת. מיד הוטל הסגר על עדרי הכפר, הפרות הנגועות חוסלו, והמשיכו בבדיקות דם תכופות עם חיסול כל בהמה מגיבה, עד שדוכאה המחלה. בס"ה נשחטו במבצע זה יותר ממאה פרות. במרוצת השנה האחרונה נתגלו שני מוקדי נוספים בבקר מקומי: אחד במרכז הארץ והשני בדרום. לאחרונה נתגלתה התפרצות נוספת של ברוצלזיס, מלווה הפלות רבות, בעדר בקר מקומי, באחד מכפרי המיעוטים שבואדי ערה

מחלת ההפלה המדבקת בבקר (ברוצלוזיס) היתה בעבר הרחוק אחת המחלות ההרסניות ביותר וגרמה נזקים כבדים למשקי הבקר בארץ.

ש. גוזמן ובניו בע"מ

תל-אביב • רח' הקישון 16 • טל. 820158

סוכנים בלעדיים

לציוד חליבה ומחלבות

תוצרת

ALFA-LAVAL

מחלקה מיוחדת לטיפול בזבל

נוזלי ומוצק:

- משאבות לשאיבת זבל מטפחות ובורות — קוצצות וטוחנות בהפעלה חשמלית או על-ידי טרקטור. כמו-כן משאבות טבילות בכל הגודלים.
- משאבות לריסוס ולהגברת לחץ בקווי מים.

1. לא לרכוש בקר, אלא ממקור בטוח, ורק לאחר בדיקת דם לברוצלוזיס ואישור מ- לשכה וטרינרית ממשלתית;

2. לא לרעות בקר בשכנות לעדרים חשודים או על אדמות עליהם רעה בקר כזה.

3. להודיע לרופא הווטרינרי על כל מקרה הפלה בבקר ולשלוח את הנפלים לבדיקה למכון הווטרינרי, בתנאי קירור מתאימים.

4. בעדרי הבקר, אם לחלב או לבשר, צריך להקפיד על חיסון סדיר ב"זון 19" של כל העגלות בגיל 3 עד 8 חודשים.

לא קשה למנוע חדירת ההפלה המדבקת לעדר. גם אם חדרה המחלה למשק ונתגלתה בראשיתה יש עוד סיכוי סביר לבערה. אך אם השתרשה המחלה בעדר, שוב אין לו לעדר תקנה אלא חיסול כללי.

הבוקר הזהיר יבחר בדרך הראשונה ויבוא על שכרו!

(ברכס הרי אפרים). בדיקת שאר עדרי הכפר גילתה גם בהם מגיבות למחלה. נעשים מאמצים לאיתור המחלה בכפר ולחסלה, כפי שנעשה בכפר האחר, באזור נצרת. כמו כן, ננקטים צעדים לגילוי מוקדים אפשריים נוספים ברחבי הארץ. בינתיים עלולה המחלה לחזור לכל עדר במדינה, מכל סוג שהוא, ע"י רכישת פרה נגועה או „נושאת המחלה“, או ע"י רעייה במרעה שוועה ע"י עדר נגוע, או שנמצא בשכנות עם עדר כזה. אין ספק, שבכל עדר בארץ — גם המחוסן ב"זון 19" — מצויות בהמות רבות או מעטות, שלא חוסנו בשעתן או שלא התחסנו כהלכה, מסיבה כל שהיא. בהמות אלה נדבקות ראשונות, נפגעות במחלה ומפילות, וגורמות להפצת שפע רב של חידקי ברוצלה אלימים במשק, דבר שמוליד לשבירת החסינות גם של הפרות החסונות ולהרס רב בעדר.

לפיכך מצויים בעלי הבקר, מכל הסוגים, לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:



מחלת הדבר בבקר

לתקופה של 8 שנים. אי לזאת, עומדים השרותים הווטרינריים לחסן השנה את בני הבקר שטרם חוסנו ושגילם בין 6 ל-18 חודש.

החיסון — חובה, ומחירו 60 אגורות לראש.

על בעלי הבקר להגיש את כל העזרה לעובדי השרותים הווטרינריים, על מנת לאפשר ביצוע מהיר של החיסון.

על בעלי בקר להודיע על כל חשד לדבר הבקר לרופא הווטרינרי הקרוב ביותר למגוריו.

מחלת דבר הבקר (Rinderpest) עדיין שוררת בארצות השכנות. מחלה זו פוגעת בבקר, אך יכולה להיות מועברת ע"י צאן, חזירים ואיילות. סימניה הם: חום גבוה, שלשול, נזילת רוק ופצעים בפה. המחלה נמשכת 3—9 ימים. בעדר נגוע נתקף כל הבקר בדבר, כ-90% ממנו מת, ואין כל תרופה יעילה לטיפול בבהמה החולה. המחלה לא פקדה את הארץ מאז 1927. חדי-רתה והתפשטותה עלולות להרוס את עדר הבקר. הבקר שחוסן ב-1970/1971 עמיד בפני המחלה



הטיפול נגד זבוב חרר העור

אין לכלול בטיפול בקר המיועד לשחיטה תוך חודשיים ולא בני בקר עד גיל 3 חודשים, וכן — לא בהמות חולות. לפרות החלב (היוצאות למרעה) יש לעשות הטיפול מיד לאחר החליבה ולא בשעת החליבה.

הוראות נוספות אפשר לקבל בכל לשכה וטרי-נרית.

באזורים נגועים, שהחקלאים לא יטפלו בבקרם בעצמם, רשאים השרותים הווטרינריים הממשלתיים לעשותו אצלם כטיפול חובה, ולחייבם בתשלום האגרה לפי החוק.


הנהלת השרותים הווטרינריים
משרד החקלאות

יולי 1972

הטיפול נגד הזבוב נעשה בחומר זרחן-אורגני (רואלן — Ruelene), ע"י שפיכתו על גב הבקר פעם בשנה. הוא נמצא יעיל להשמדת הרימות, שמהן מתפתח זבוב חרר העור. הוכח, שאפשר לעשות טיפול זה גם לפרות חלב ללא חשש.

כתוצאה מהטיפול בשנים קודמות פחתה במידה ניכרת פעילות הזבוב והנזקים הנגרמים על ידו. עתה הגיעה שוב עונת הטיפול. על החקלאים באזורים בהם מצוי הזבוב עונת האביב (מקצה הצפון עד לקו גדרה, ודרומה מגדרה יש לכלול את הישובים במובלעת לכיש) לטפל בהקדם בכל הבקר היוצא למרעה.

המנה לראש בקר, מכל הגילים, הוא 20 מ"ל רואלן ו-80 מ"ל מים, אותם מערבבים יחד ושופכים על הגב.



שפיכת תמיסת „רואלן“ על גב הבקר