

טבילת פטמות או ריסוס בתמיסת חיטוי

- ה. הכוסית נשמטת מהידיים ונופלת ;
1. טיפול בכוסית וניקויה אחרי כל חליבה.
 3. היגיינה לקויה
 - א. הכוסית על תוכנה משמשת גורם הדבקה לפטמות בריאות אחרי מגעה עם פטמות נגועות ;
 - ב. חדירת זבל ושתן לכוסית פנימה ;
 - ג. הכוסית מזדהמת עם נפילתה על הרצפה.
- עם האמור לעיל כדאי לבדוק ביסודיות :
- אם הריסוס אינו עדיף על הטבילה מבחינת ההיגיינה, כי בריסוס נרטב חלק ניכר של העטין כולו ;
 - נוחות, בטיחות, מהירות וקלות הביצוע, תוך בחירת מכשיר מתאים לריסוס ושימוש בריכוז תמיסה מתאים.
- עובדיה גמיל**
- במעקב אחר טיב החליבה במשק הקיבוצי התרשמתי, שטבילת הפטמות (Dipping) אחרי החליבה אינה מבוצעת כראוי מסיבות הבאות :
1. אי טבילת הפטמות בתמיסת החיטוי
 - א. ביצוע לא נכון, כלומר — אין טובלים את הפטמה בכלי התמיסה — בכוסית, אלא מצמידים אותה ליד הפטמה ;
 - ב. כמות התמיסה בכוסית מועטה לרוב ;
 - ג. ויתור על טבילת הפטמות אצל פרות בעטניות.
 2. אי נוחות
 - א. טלטול הכוסית והעברתה מפרה להברתה ;
 - ב. הכוסית מתרוקנת מהר מתוכנה וגם נשפך ממנה במרוצת החליבה ;
 - ג. בתמיסת החיטוי נרטבות גם הידיים ;
 - ד. בעיטת פרות בשעת הטבילה ;

כללים לחליבה היגיינית

(המלצות ועדת מימשק החליבה)

- מטרות החליבה ההיגיינית הן :
- להקטין את אוכלוסיית החידקים הנמצאים על העטין והפטמות ;
 - למנוע העברת חידקים פטוגניים מעטני פרה אחת למשניה ;
 - לסלק, או לפחות להקטין את מספר הפטוגנים שנשארו על הפטמה (בעיקר על פי הפטמה) לאחר החליבה ;
 - להקטין את אוכלוסיית החידקים שבחבירות מזהמות שעל הפטמות, ואלה שנמצאים בכלי
- החליבה (בעיקר חלקי הגומי של יחידת החליבה), על ידי החולבים וסביב הפרות בביתן החליבה. אמנם בשיטות הקיימות (מבחינת הריכוזים המקסימליים של חומרי חיטוי שאינם פוגעים ברקמת עור הפטמות והעטין) אין אפשרות לחסל באופן מוחלט את אוכלוסיית החידקים, אבל ע"י הקטנת שיעור הזיהום החיצוני של העטין והפטמות אפשר להפחית את שיעור הנגיעות בעטין פנימה.
- במידה והאמצעים ההיגייניים בחליבה מקיפים יותר, שיעורי הדבקות העטינים נמוכים יותר.