

חליבה וניהול של עדר מתועש גדול.



רוברט גרי מקליפורניה

בסוף חודש מאי התקיים בעין החורש, ביוזמתם של סוכני באומטיק בישראל, האחים פולק, יום עיון בנושא חליבה וניהול של עדר מתועש גדול. המרצה האורח, רוברט גרי, הינו אחד המומחים הידועים לגידול בקר וניהול משק בארה"ב. הוא שותף במשק בן 2,000 פרות בקליפורניה, מנהל אותו ויועץ לחברת באומטיק. הרצאתו המעניינת לוותה בשיקופיות ודנה הן בעקרונות ציוד החליבה, לפי התפיסה הקליפורנית, והן בנוהלי החזנה והממשק כפי שהם נהוגים במשקו.

בדברו על ציוד החליבה, עמד המרצה לא רק על חשיבותן של נורמות טכניות בתכנון מבנה המכונה, אלא הדגיש במיוחד את חשיבות הטיפול והאחזקה השוטפים של מתקני החליבה: ניקוי קפדני יומיומי וטיפול שבועי בידי המשק ואילו ביקורת ואחזקה חודשית ע"י טכנאי! כל אלה וביצוע קפדני של החליבה הביאו לידי כך שכלל החלב של 2,000 פרותיו עומד באופן תדיר בדרגה בין 0 ל-1 של CMT. המרצה קבע כי מניעת מסטיטיס הינה מטרה ראשונה בהשגת ריווחיות בייצור חלב! אמנם יש מקרים מועטים של דלקות עטין (פרות אל), כמו כל פרה עם חלב חריג, נחלבות בבית החולים המיוחד!), אך בשנתים האחרונות לא יצאה אף פרה אחת את העדר מסיבת מסטיטיס!

הפרות מחולקות לקבוצות של 100 ראש, מבכירות לחוד, פרות מבוגרות לחוד ויתר הפרות לחוד, כשכל בהמה מועברת רק פעמים במשך תקופתה מקבוצה לקבוצה. החזנה היא אחידה לכל הפרות, כולל המבכירות, בכל שלבי תקופתן: כ-2 ק"ג חציר אספסת ארוך, 11 ק"ג מזון מרוכז ותחמיץ תירס חופשי (מ"מ 30 ק"ג ומעלה, לפי רצונה ויכולתה של הפרה). תנובת 2,000 הפרות כ-9,500 ליטר פרה/שנה!

חשיבות מרובה ייחס המרצה להחזקת פרות מבוגרות בעדר, בכדי להגיע לתנובות

מקסימליות. שיעור היציאה השנתי בעדרו הוא 12% בלבד, מזה 8% מסיבות אי-פוריות. מזריעים לראשונה בייחום השני אחרי 40 יום מההמלטה או בייחום הראשון אחרי 60 יום מההמלטה. בממוצע דרושות 2 הזרעות להריון. יום העיון הסתיים בביקור במכון החליבה המצויד במכונת באומטיק, בחליבה לצינור, וסרט מעניין על חליבה נכונה, מטעם החברה. האירוח הנאה מצד המשק, האורח המכובד והסידורים של חברת אחים פולק – כולם תרמו ליום מעניין ונעים לאורחים הרבים שנטלו בו חלק.