

ועוד על תאים ומסטיטים

על ריפוד של קש בהשוואה לאלה השוכנים בתאי רביצה; ספירת תאים נמוכה יותר אך ארוע מסטיטים רב יותר בעדרים בהם נהוג חיטוי פטמות אחרי החליבה; וספירה גבוהה יותר ללא שינוי בארוע המסטיטים הקלינית כתוצאה מחליבת יתר, אף ממושכת מאוד.

להלן הגורמים שזוהו כחשובים ביותר בשמירת רמה נמוכה של תאים: שיכון נקי ויבש; מינון נכון של חומרי חיטוי; רוטינה קבועה לפרות ומינימום של הפרעות בה; הפעלה נכונה של ציוד החליבה.

החוקרים מאדינבורג מסיקים שתוצאות המחקר מצביעות על כך שיתכן שסוגי מסטיטים מסויימים – קשורים חיובית לספירת התאים, בעוד אחרים, בעיקר הדבקות מקולי – אינם קשורים בה. כן מדגישות התוצאות את חשיבותם של שיכון מטופל, ממשק טוב והיגיינה במכון החליבה.





הירחון הבריטי "דיירי פרמר" מפברואר 1981 מדווח על חקר שבוצע בקבוצת עדרי חלב מסחריים בנושא מחלות עטין. תוצאותיו מביאות את חוקרי הפקולטה לחקלאות באדינבורג, סקוטלנד, לעורר ספק בדעה המקובלת על יחס חיובי בין ספירת תאים בכלל החלב (החלב שבמיכל) וארוע מסטיטים קלינית בעדר הנתון.

אמנם ב-10 עדרים, שספירת התאים בחלבם היתה מתחת לממוצע באופן קבוע, היה ארוע מסטיטים קליני נמוך מהממוצע אף הוא. אך בכשליש מהעדרים הנחקרים, בעלי למעלה מ-40 פרות כ"א, היתה ספירת התאים נמוכה, בעוד ארוע הדלקות היה רב. בנוסף לכך, בעדרים האחרים בעלי ספירת תאים מעל הממוצע, נטה ארוע המסטיטים להיות משתנה מאוד.

בין הממצאים האחרים נמצא: פחות מסטיטים, למרות ספירות תאים גבוהות מהממוצע בדרך כלל, בעדרים משוכנים בחצרות

טוב לי עם מאוורד כלן

- מאווררים בגדלים ובהספקי אוויר שונים המותאמים במיוחד לפעולה ביוליים ורפתות (לאווירור שלילי וחיובי).
- המפוח היחיד עם כנפים מפלדת אל-חלד ומסגרת פלדה מגולוונת.
- ציוד בקרת אוויר אוטומטי וידני.
- מתקני עירפול צינור ותורסת לחות ללול ולרפת.
- מזרונני לחות.



הציוד המוצע הותאם במיוחד לדרישות המשק הישראלי ונבדק ואושר ע"י המכון להנדסה חקלאית – בית דגון. פנה עוד היום לקבלת יעוץ ללא כל התחייבות. 'אספקה', התקנה, שרות

"כלן" בע"מ ת"א ציטליו 8 טל. 269550 262568