

ריענון

רענון וולקני

ומתרככות מהר מאוד, לכן הן דוחות את האוויר, מתחמצות מהר, ועל ידי כך הן מונעות חדירת אוויר ביניהן ומתחתן. כיוון תחמיץ בשכבת קליפות היא דרך בטוחה לשימור. האכלת השכבה המכסה את התחמיץ אינה מסוכנת.

קליפות פרי הדר

לעתים מושמעות אזהרות על נזקים אפשריים לפעולות מערכת העיכול, כתוצאה מהאכלת קליפות שאוחסנו במשך למעלה מ-3-4 ימים. אין הדבר כך. אמנם עדיף להאכילן טריות ככל האפשר, אולם אם מטעמים של ממשק, הובלה ועוד חלק מהקליפות נשאר זמן ארוך, אין בכך כל סכנה לבריאות, אלא הפסד של חומרי מזון "שנוקזו" במיץ ואבדו. ועל כן חבל. זו אולי הזדמנות להזכיר כיצד הוכנסו הקליפות למזון הבקר ולתחמיץ. בשנות מלחמת העולם השנייה, נותרו כמויות גדולות של פרי שלא שווקו. כדי למנוע ביזבז הפרי ולמצוא לו שימוש סביר, נבדקה על ידי ד"ר כרמון ז"ל ופרופ' סמיש ז"ל אפשרות של הרקבת הפרי בערמות מכוסות עפר. והנה תחמיץ משובח ביותר. מאז כללנו את הפרי השלם כחלק בתחמיצים, כמקור לסוכר קל תסיסה, וככיוו הטוב ביותר לתחמיץ. כידוע הקליפות קורסות – כללי.

ההזנה ביובש ובראשית התחלובה
בתקופת היובש מגישים לפרות רמות גבוהות של ויטמין D ושל סלניום, בעיקר לאלו שהיו להן הפרעות בפריון.

התוספות מזרזות התנקות מערכת המין ומונעות היווצרות ציסטות בשחלות. הוספת זרחן מאזנת את היחס סידן : זרחן ומצמצמת או מונעת סכנת קדחת חלב.

אחרי ההמלטה ועד לתגובת השיא מגדילים בעיקר בפרות שמנות, את כמות החלבון היומית, כדי להשלים את היחס אנרגיה:חלבון. עם התקדמות התחלובה מקטינים את אחוז החלבון במנה. רמות גבוהות של חלבון מעל הדרוש, עלולות לגרום לקשיים בהתעברות.

לצורך הערכת אחוז החלבון יש להגחשב במקורו ובנעילותו, ולא רק בתכולה של חלבון



שערותיו של איכר גרמני צמחו מחדש בעקבות לקיקות פרה

מערב גרמניה (ע"צ). ספר בעיד טריר החליט להילחם בקרחת של שניים מלקוחותיו, באמצעות לקיקותיה הנמרצות של פרה בת חמש, שעליה הסברה, גורמים לחידוש צמיחת השער. אריך שמיט, 49, מסר לעיתון "בילד אם זונטאג", כי שאב את השראתו מחקלאי אנגלי מהעיר סולסברי, ג'ון קומס. קומס, שהיה קרח משך 30 שנה, טוען כי עתה, בהיותו בן 56, חידשו שערותיו את צמיחתן מאז שאחת מבין 49 פרותיו החולבות מלקקת בקביעות את פדחתו. ליזל, הפרה הגרמניה, החליטה מצידה לעשות מאמצים כדי לנסות ולא לאכזב את וולפגאנג פינד ויילי וסטורגס, לקוחותיו של הספר. דרמטולוג מהעיר אולדנבורג בצפון-גרמניה, נדברט גולניק, אינו מופתע מהחלייד. "הרוק של פרה מכיל כמות של חומרים כימיים ובקטריות כגון אשלגן, פוספט וכלוריד. תערובת זו והעיסוי באמצעות לשונה המחוספסת של פרה יכולים להביא לחידוש צמיחת השער" – מסר העיתון.

5.3.84 הארץ 2