

רשימת תכשירים כימיים המורשים לשימוש על בקר וצאן להדברת טפילים חיצוניים (מעודכן ל-1.1986)
נמסר ע"י א. הדני, ש. רוזן, מ. זיו וק. פריש המכון הטרוינרי, בית דגן, י. ירוחם "החקלאית", מדרה

החומר והמשוק	הטיפול	איברמקטין	פורמולציה	שיטה	ריכוז	מינון	הערות
איזומק (אסיא - ריזל)	זכוב חדר העור בבקר.	גרב וזכוב נחיר הכבש בצאן.	1% תמיסה	זריקה תת- עורית	ללא מהול	0.2 מ"ג/ק"ג משקל גוף 1)	אין להשתמש תוך 21 ימים לפני שחיטה. אין להשתמש בבע"י
	גרב וזכוב נחיר הכבש בצאן.					מ"ל ל-50 ק"ג משקל גוף)	בתחלובה או 28 ימים לפני המלטה. אין להוריק תוך וידית או תוך שרירית. התכשיר יעיל גם נגד תולעים עגולות במערכת הגשימה והעיכול.
אסונטול (אביק)	טפילים חיצוניים בבקר	קומפוס (ורדן אורנגי)	תרכיב מתחלב 16%	ריסוס	0.03% חומר פעיל	5-3 ליטר תרסיס לפי גודל הבהמה	מותר לשימוש גם על בע"י בתחלובה ברכוז המומלק. ברכוז המאושר לבקר תכשיר זה הינו בעל יעילות מוגבלת כנגד קרציות והסר יעילות כנגד גרב.
גמזול לבקר 10% תחליב מתחלב (תפול)	טפילים חיצוניים בבקר	לינדן (פחמימן כלורי)	תרכיב מתחלב 10%	ריסוס	0.05% חומר פעיל (1:200)	5-3 ליטר תרסיס לפי גודל הבהמה	אין להשתמש על בע"י בתחלובה ועל בני בקר עד לגיל שבועיים.
G x 118 (אלון כימיקלים)	זכוב חדר העור בבקר	פוסט (ורדן אורנגי)	תרכיב מתחלב 11.6%	שפיכה על הגב	4% חומר פעיל (1:2)	30 מ"ל תחליב ל-50 ק"ג משקל גוף עד לכמות מירבית של 250 מ"ל לבהמה	אין להשתמש בפרות בתחלובה, 21 יום לפני השחיטה, על בע"י חולים או בגיל פחות מ-3 חודשים. במשך שבועיים לאחר הטפול אין להשתמש בתכשיר זוחני אורנגי או קרבאמטי אחר. הטיפול ינתן בחודשי יוני-יולי בלבד.
הכסלון לבקר 10% אביקה רטיבה (ר"ד מירדן)	טפילים חיצוניים בבקר	לינדן (פחמימן כלורי)	אבקה רטיבה 10%	ריסוס	0.05% חומר פעיל (1:200)	5-3 ליטר תרסיס לפי גודל הבהמה	אין להשתמש על בע"י בתחלובה ועל בני בקר עד לגיל שבועיים.
הכסלון לבקר 10% תרכיב מתחלב (ר"ד מירדן)	טפילים חיצוניים בבקר	לינדן (פחמימן כלורי)	תרכיב מתחלב 10%	ריסוס	0.05% חומר פעיל (1:200)	5-3 ליטר תרסיס לפי גודל הבהמה	אין להשתמש על בע"י בתחלובה ועל בני בקר עד לגיל שבועיים.

החומר והמשווק	הטיפול	חומר פעיל	פורמולציה	שיטה	ריכוז	מינון	הערות
הפסלון לצאן 10% שמו (ד"ר מירון)	טפילים חיצוניים בצאן	לינדן (פחמימן כלורי)	אבקה רטיבה 10%	טבילה	0.025% חומר פעיל (1:400)		אין להשתמש על כבשים בתחלובה.
	הפסלון לצאן 10% תרכיז מתחלב (ד"ר מירון)	טפילים חיצוניים בצאן	תרכיז מתחלב 10%	ריסוס	0.025% חומר פעיל (1:400)		אין להשתמש על כבשים בתחלובה.
וורבאקס (יבנין - יפה)	זכוב חדר העור בבקר	פמפור (ורחן אורגני)	תרכיז 13.2%	שפיכה על הזב	ללא מהול	30 מ"ל תחלב ל-100 ק"ג משקל גוף עד לכמות מרבית של 120 מ"ל לבהמה	אין להשתמש בפרות בתחלובה, 21 יום לפני השחיטה, על בער"י חולים או בגיל פחות מ-3 חודשים. במשך שבועיים לאחר הטיפול אין להשתמש בתכשיר זרחני אורגני או קרבאמטי אחד. הטיפול ניתן בהרדשי יוני-יולי בלבד.
טאקטיק (אלון כימיקלים)	טפילים חיצוניים בבקר	אמיטון (פורממידין)	תרכיז מתחלב 12.5%	ריסוס	0.025% חומר פעיל (1:500)	3-5 ליטר תרסיס לפי גודל הבהמה	מותר לשימוש על פרות בתחלובה. אסור לשימוש בקלוטי פרסה (פוסידים, המוריס וכו').
טימאטול (אגרון)	קוציית	סימאול תרכיז	ריסוס 30% מתחלב	ריסוס	0.03% חומר פעיל (1:000)	5-7 ליטר תרסיס לפי גודל בעל- החיים	מותר לשימוש בפרות בתחלובה; לשחיטה יש להמתין 3 ימים לאחר הטיפול; לפני החליבה הראשונה לאחר הריסוס חשוב לרחוץ היטב את העטין והפטמות.
סטומוקסין (תפול)	זכובים על בקר	פרמתרין (פירטוראיד)	תרכיז מתחלב 20%	ריסוס ערפילי	0.1% חומר פעיל (1:200)	500-100 מ"ל תרסיס לראש לפי משקל גוף	מותר לשימוש על פרות בתחלובה.
סנו דיסי 30 (מפעלי ברונוס)	זכובים על בקר	פירטורין + טבעי סינטיטיים + חמץ דוחה טבעי	תרכיז מתחלב 9% פירטורין	ריסוס ערפילי	0.075% חומר פעיל (1:30)	50-250 מ"ל תרסיס לראש לפי גודל הבהמה	מותר לשימוש על פרות בתחלובה.

מותר לשימוש על פירות בתחלובה.	מו"ל 250-50 תרסיס לדאש לפי משקל גוף	0.1% חומר פעיל (1:20)	ריסוס ערפילי	תרכיב מתחלב 8%	פירטום + טבעי סינטיטיים	זבובים על בקר	PB-2W (כימנת 2000)
מותר לשימוש על פירות בתחלובה.	מו"ל 250-50 תרסיס לפי משקל גוף	0.1% חומר פעיל (1:50)	ריסוס ערפילי	תרכיב מתחלב 20%	פירטום + טבעי סינטיטי	זבובים על בקר	פירומט 50 (יבנין - יפה)
מותר לשימוש על פירות בתחלובה.	מו"ל 500-100 תרסיס לפי משקל גוף	0.1% חומר פעיל (1:200)	ריסוס ערפילי	תרכיב מתחלב 20%	פומתיין (פירטורואיד)	זבובים על בקר	פומקסין (יבנין - יפה)
מותר לשימוש על פירות בתחלובה.	מו"ל 250-50 משקל גוף	0.1% חומר פעיל (1-10)	ריסוס ערפילי	תרכיב מתחלב 4%	פירטום + טבעי סינטיטי	זבובים של בקר	קלאק יונקים (סיקא)
יש לאבק ביסודיות את התצורות ובמיוחד סביב השקתות, עמודים וגדרות. התכשיר משמש במקרים מיוחדים בהמלצת השרותים הטרינריים ובאישור הדופא המטפל.	פיזור על פני הקרקע	אבקה לאיבוק 2.5%	לינדן (פחמימן) כלורי	קריצות הרפת	קריץ (ד"ר מירון) גמזול (תפול)		

(*) חלק אחד חומר על 500 חלקים מים.