


גידול



מכתב לעובדי היונקיה

4. חטא את הטבור ביד. יש בקופסת פלסטיק לבנה על אחד הקירות, טבול הטבור בתוך הקופסא.
5. הגמע את הוולד בקולסטרום קרוב ככל האפשר למועד ההמלטה.

איך להגמיע?


בדרך כלל, במקרה יש בקבוק המכיל קולוסטרום ברמת נוגדנים גבוהה. קח את הבקבוק, ושפוך את תוכנו לדלי הנירוסטה הקטן. קח דלי נירוסטה גדול ומלא אותו עד שלושת רבעי הדלי במים חמים ככל האפשר. תניח את דלי הנירוסטה הגדול על האש במטבח. תוך כדי חימום המים הנח את הדלי

בוקר טוב לך, תורן!
שמי עדנה ומספרי 567, נולדתי לאם מספר 326 לפני כחודש ימים, ועברתי כבר כמעט את כל מסלול ההגמעה, אני אשמח כדוברת שאר העגלות ואנסה להורות לך כיצד לנהוג בכל שלב ושלב בעבודתך. כמוכן שלסגנון עבודתך – קרי מצב רוח מרומם, סבלנות, חמימות לעגלות, חיוך ואורך רוח – יש חשיבות לא פחותה מאופן ביצוע ההוראות.

אני כמעט משוכנעת שעם סיום עבודתך אצלנו, תהיה לך הרגשת סיפוק, כפי שלא זכית לה הרבה זמן. אל תחשוש לבקש מאורי שהוא האבא והאמא שלנו תורנות נוספת בשבת הבאה. לא בטוח שהוא ייענה בחיוב, משום שרבים כמוך מבקשים תורנות נוספת.
ובכן ניגש לעבודה. הגעת ליונקיה – כמוכן במצב רוח מרומם, אם לא, אל חשש, מצב הרוח ירומם בהמשך.

בדוקינא בתא המלטות (רפת ג') אם נולד/ה עגל/ה. אם בר מזל אתה תמצא ולד ואז עליך לעשות מספר פעולות בסיסיות.

1. העבר את הוולד בעגלה הצהובה לכלוב בו רשום "שיכון חדש". אם אין משטח, שים משטח מתאים לכלוב. שים לב! יש כלובים מסוגים שונים ולפיכך משטחים שונים.
2. העבר את אם הוולד לחליבה, אם יש חליבה כעת ואם לאו, העבר אותה לאחת הקבוצות: מבכירה לרפת א' או ב', פרה לרפת ה'.
3. עדכן את החולבים – הם ירצו לעזור לך במידת הצורך.



העגלים/ות בכלובים רגילים לשתות פעמיים ביום, כל פעם 1.5 ליטר קולוסטרום. חימום החלב נעשה כפי שרשום בהכנת קולוסטרום להגמעה (דלי קטן בתוך דלי גדול וכו'). לאחר שהגמעת את כל העגלות בכלובים, דאג לשטוף את הרצפה מתחת לעגלות מבלי שהעגלות יירטבו. ולעומת זאת, שהרצפה תהיה נקייה. כמובן כל זה, פעמיים ביום. זכור! נקיון זה ערובה להצלחה.

הגמעת תחליף חלב

הגמעת תחליף חלב תיעשה רק לעגלות שסיימו את תקופת הקולוסטרום. הוראות להכנת תחליף חלב:

- ☐ מלא מערביל במים חמים (70°C) כ-15 ליטר.
- ☐ שקול את כמות האבקה הרשומה על הלוח בהתאם לכמות הליטרים הרשומה למטה.
- ☐ הכנס האבקה למערביל רק לאחר שהמערביל הופעל.
- ☐ המתן כ-10 דקות בכדי שתחליף החלב יתערבב היטב, לאחר מכן הוסף מים קרים עד לטמפרטורה של 42° צלזיוס.

שלכם

עדנה (567)

הביאו לדפוס: אורי שמחה, נצר סירני,
דורך שפירא, לשכת
הדרכה רחובות.



הקטן המכיל את הקולוסטרום בתוך הדלי הגדול. הוצא את הקולוסטרום כשמד החום יראה 42°C . שפוך החלב בעזרת משפך לתוך בקבוק, התקן מוצץ בעל פיה קטנה על הבקבוק והגמיע את הוולד בסבלנות ובנחת, אחרת כל שעשית שווה ל... אם לא מצאת במקרר בקבוק המכיל קולוסטרום ויש לך אפשרות להגמיע בקולוסטרום מהאם, גם זו אפשרות. מכל מקום, דאג שהחולבים יקחו קולוסטרום ראשוני מאם הוולד.

בוא נראה מה לעשות אם אינך בר מזל ולא מצאת וולד. בדוק אם יש הוראות כתובות. בדרך כלל, אורי לא סומך על האינטואיציה של התורנים ומשאיר הוראות. אם אין הוראות אז תשמע ממני, יש לי נסיון.

במקרר תמצא בודאי כמה דליים, רשומים עליהם סוגי הקולוסטרום. הסיווג מתייחס לרמת הנוגדנים בקולוסטרום ונקבע בעזרת קולוסטרומטר:

קולוסטרום גבוה – לעגלות ביום ראשון ושני להיוולדן,

קולוסטרום בינוני – בימים שלישי ורביעי,

קולוסטרום נמוך – בימים חמישי ושישי.

אם אין קולוסטרום גבוה, תן בינוני, וכן הלאה, אבל השתדל לעבוד על פי הנוסחה למעלה.

לבוקרי ישראל ולכל ידידי ואוהדי הענף

שלוחות מיטב ברכותינו

לחג הפסח תשמ"ו וליום העצמאות ה-38

התאחדות מגדלי בקר בישראל