

השפעת סוג המזון הגס על ייצור החלב והרכבו בראשית התחלובה

עופר קרול

אספסת, חיטפון וש"ש הוכנו כתחמיצים והושו כמקור מזון גס בלעדי במנה. הפרות חולקו באקראי בין הטיפולים כבר ביום ההמלטה למנה, אשר הכילה אחד משלושת התחמיצים לתקופה של 4–116 ימים אחרי ההמלטה. האספסת נקצרה בשלב "חצי פריחה", החיטפון בשלב "חצי שליפה" ושיבולת-השועל בראשית הפריחה. המנות אוזנו ביחס של 50:50 מ"ג: מ"מ, אוזנו לחלבון ומינרלים והוגשו לבקר כמנות שלמות.

הפרות שהואבסו בחיטפון ייצרו יותר חמ"ש (3.5% שומן) ($P < 0.05$) מאשר אלה שהואבסו בשיבולת, בעוד קבוצת האספסת נמצאה ביניהן. לא נמצאו הבדלים משמעותיים באחוזי השומן, החלבון וכלל המוצקים בחלב. חומר יבש נאכל היה גבוה יותר במנת האספסת ($P < 0.05$) והחיטפון בהשוואה למנת השיבולת. ריכוז התוצאות מובאות בטבלה להלן:

אספסת	חיטפון	ש"ש	
15	15	12	פרות לטיפול, מס'
29.4	32.7	27.6	חלב מושווה שומן (3.5%), ק"ג
3.7	3.7	3.9	שומן, %

הערת המלב"ד: כדאי לשים לב לניסויים כגון זה היכולים לעזור לנו להבין טוב יותר את ההשפעות של סוגי המספוא השונים.

הנסיון נערך ע"י J. C. Paulson וחבריו באוניברסיטה של מינסוטה. תרגום חופשי מתוך: 82nd Annual Meeting, American Dairy Science Association JDB 70, Sup. 1, p. 196 (1987).



ברודימת פתיון
כופתיות להדברת מכרסמים

גרגימת פתיון גרגירי להדברת

מכרסמים

מכילים 0.005% ברודיפקום BRODIFACOUM

תוצרת ICI

הדברה במנה מזערית בהאכלה
חד-פעמית

הדברה במנות האכלה בנות 20–30 ג'
(אריזות מוכנות)



- * יעילות בהדברה
- * חסכון במתיון
- * חסכון בעבודה
- * חסכון כספי
- * נוחות בהדברה
- * בטיחות
- * לבעלי-חיים אחרים.



המשווקים בישראל: טבעון-כים בע"מ
חיפה, דרך העצמאות 59, ת.ד. 33428
טל. 04-521866, בערב 04-931075.