

רשימת הנכשירים כימיים המורשים לשימוש על בקר וצאן להדברת טפילים חיצוניים

(מעודכן ל-1.87.1).

החומר המורש	הטפיל	חומר פעיל	פורמולציה	שיטה	ריכוז ומיקור	סבירות	הערות
איברמקטן (אסיא - רזיל)	זנוג חר העור בבקר; גרב באן	איברמקטין	תמיסה 4%	זריקה תת-עורית	ללא מיקור משקל גוף 0.2 מ"ג/ק"ג או להשתמש בנע"י בתחלבה או 28 ימים לפני ההזדווגות. אין להזדווגות חור-ורידית או ק"ג משקל גוף) חור-שרידית. תכשיר יעיל גם נגד חרליים עגולות במערכות הנשימה ומערכת.		
אסונטרל (אניק)	כנינים	קומפוס (זרחן אורגני)	חרכיז מתחלב 16%		0.03% חומר 3-5 ליטר והסיס לפי גודל הבתנה (1:500)*		מותר לשמוש גם על נע"י בתחלבה בריכוז המותר. בריכוז המאפשר לבקר לחלב תכשיר זה הינו בעל יעילות מוגבלת כנגד חרליים וחסר יעילות כנגד גרב.
אנטסקבין	אקריות	בנזיל בנוואט	משהה 20%	טיפול מקומי	ללא מיקור בהמאס לצורך לבצע לפחות 3 טיפולים בתדירות של אחת לשבוע, לאחר ניקוי האזור		
בלטיק	פרעושים (על בני בקר) פרעושים (צאן)	פרופטפוס	35%	ריסוס	0.05% חומר 2-3 ליטר פועיל (1:700) חומרים לראש לפי משקל פועיל (1:1750) גוף		יש לוטס בתדירות של אחת לשבועיים
גמזול לבקר 10%	גרב, קרציות וכנינים	לינדן (פחמקסן כלורי)	חרכיז מתחלב 10%	ריסוס	0.05% חומר 3-5 ליטר פועיל (1:200)		אין להשתמש על נע"י בתחלבה וכל בני- בקר עד לגיל שבועיים.
חרכיז מתחלב (מפזול)							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

הגיע למערכת בנובמבר 1987.

המעבדה לאנטומולוגיה - המכון הוטרינרי, בית דגן
ד"ר י. ירוחם, הייזקלאית", גדרה



בוצי 866

מן הרפת של קב' גור הינה בת לפר פטון 765, הניבה בשלוש התחלובות הראשונות ב-1046 ימי חליבה: 47,543 ק"ג חלב עם 1,209 ק"ג שומן (2.54%); בממוצע ליום חליבה עד כה 45.5 ק"ג חלב עם 1.159 ק"ג שומן; הפרש חזוי +2,995 ואומדן הורשה +1,080.



בתמונה הקטנה – עגל בן לפר ספיריט (זירמת יבוא) ולפרה בוצי 886, אותו מגדלות ומטפחות בנות גור לתפארת הוריו והעדר כולו, במטרה שישמש כפר להזרעה מלאכותית.
(צילומים: דן קלי, "השרות")