


גידול



בליל כולי להאבסת יונקים

יוסי לידסקי
יועץ להזנה וממשק של בעלי-חיים, אלוני-הגליל

כללי

במשקים חייב למצוא תחליף של מזון גס לבליל היונקים. הכללת השחת כחלק מבליל היונקים (לעומת הגשתה לצריכה חופשית) עשויה למנוע צריכה מוגזמת של שחת החביבה על בני-הבקר בגילים הצעירים.

השימוש בבליל יונקים (בליל בן-אשר) נפוץ במשקים רבים. ד"ר א. בן-אשר פירסם המלצות להזנת יונקים בבליל יונקים כבר בשנת 1980 (משק הבקר מס' 167, עמ' 33); מאז הולך ונפוץ השימוש בבליל כולי להזנת היונקים, עגלות ועגלים גמולים.

הרכב מקובל לבליל יונקים המכיל מעט גרעיני כותנה וכן תוספת שחת.

חומר מזון	ק"ג בטון	תכולה בחומר היבש
גרעיני כותנה	75	חלבון 17%
שחת בקיה	100	תאית 8.7%
מלח סידן	25	סידן 0.87%
סויה	126	זרחן 0.37%
שעורה לחוצה	400	אנ' נטו 1.83 מגק"ל/ק"ג
תירס גרוס	270	ויט' A 9000 יב"ל/ק"ג
תרכיז ויטמינים	4	

הרכב מקובל של בליל בן-אשר שהיה נפוץ בשנים האחרונות.

חומר מזון	ק"ג בטון	תכולה בחומר היבש
גרעיני כותנה לבנים	100	חלבון 17%
מלח סידן (70 30)	25	תאית 13%
סויה	178	סידן 0.85%
קליפות כותנה	150	זרחן 0.40%
שעורה לחוצה	241	אנ' נטו 1.74 מגק"ל/ק"ג
תירס גרוס	300	ויט' A 13,000 יב"ל/ק"ג
תרכיז ויטמינים	6	

שימוש ב"חליפות" בבליל היונקים

כתוצאה מהמעבר לשימוש בחליפות המיוצרות על ידי מכוני התערוכת והמשמשות מקור לחלבון, מינרלים וויטמינים במנות החולבות נוצר מצב, שבמשקים רבים הפסיקו להחזיק כוספת סויה במלאי המזונות של המשק.

החליפות מותאמות לפרות חולבות אך במשקים הם הוכנסו גם לבלילי היונקים. בדרך כלל, החליפות מכילות מקורות חלבון נחותים


השימוש בבליל יונקים מעודד את צריכת המזון היבש ויחד עם זאת מספק לכרס המתפתחת חומרים תאיתיים (גרעינים וקליפות כותנה) להמרצת פעילות הכרס. מן הראוי לציין, שבליל היונקים בהרכבו המקורי יוצר מרקם ייחודי, שהוא תוצאה של ערבוב הגרעינים עם מוצרי הכותנה, מרקם מוצלח במיוחד.

בליל יונקים עם כמות מופחתת של מוצרי כותנה

צמצום כמויות גרעיני הכותנה וקליפות כותנה

דינגה LINGA

כיצד זה פועל ?



ציפוי אבץ נגד קורוזיה (גיליון קר) מגן על מתכות

לשימוש: צינורות הגידור ברפתות
לקונסטרוקציות ממתכת

הציפוי אינו רעיל לבעלי חיים

זאת לא בלילה בלילה או לילה הלילה

M.B.L. (LTD) טל. 03-5464578, פקס. 03-5464569



מהסויה וכן חנקן שאינו חלבוני (NPN) מאוריאה.

האוריאה אינה מומלצת כלל ליונקים, לכן מוטב להימנע מהשימוש בה. אם בכל זאת מכלילים חליפות בבלייל היונקים, רצוי לשמור על רמה נמוכה ככל שניתן של חלבון שמקורו באוריאה. מוצע שחלבון ממקור NPN יהיה פחות מ-1% חלבון.

במקרה שלמשק אין מלאי החומרים הנחוצים להכנת בלייל יונקים מתאים, אפשר להכין בלייל המבוסס על תערובת סטרטר ליונקים של אחד ממכונים התערובת; בלייל כזה פשוט להכנה ומתקבל בלייל הנאכל ברצון.

בלייל המבוסס על תערובת סטרטר.

חומר מזון	ק"ג בטון	תכולה בחומר היבש
גרעיני כותנה לבנים	100	חלבון 18%
שחת בקיה	100	תאית 9.3%
תערובת סטרטר	800	סידן 1.0%
		זרחן 0.6%
אנ' נטו 1.84 מג"ק/ל"ק"ג		
ויט' A 9000 יב"ל/ק"ג		

הערות שימושיות

◀ קש בבלייל יונקים: אפשר להכליל בבלייל היונקים קש חיטה ברמה של 20-40 ק"ג לטון. יש להפחית את הכמות הזו מכמות השחת בבלייל, כך שהבלייל יכיל 8-12% מזון גס.

הכללת הקש תורמת לשמירת האחידות של אכילת הבלייל באבוס ומונעת את "משיכת" המזון הגס מהבלייל. מובן שיש לאזן את הבלייל מבחינת החלבון והאנרגיה.

בני הבקר עד גיל 3-4 שבועות ישאירו באבוס חלק מהקש, בני הבקר הבוגרים יותר יאכלו את המנה בשלמותה.

◀ בלייל אבקי: במידה שהבלייל אבקי מדי כתוצאה מגריסות יתר של הגרעינים, תוספת של 1% שמן מונעת במידה רבה את האבקיות, כך שתוספת השמן עשויה לשפר את צריכת הבלייל.

