


שונות ומשונות



HOARD'S DAIRYMAN

THE NATIONAL DAIRY FARM MAGAZINE
מידע מועיל לקומפוסטציה

H.D. V/98

חוברת סוף מאי ש.ז. של הירחון הווארד'ז דיירימן מביא מאמר בענין אמצעי קידום השיווק של קומפוסט מן הרפת. כותב הדברים הוא עובד במשק חלב בצפון-מזרח ארה"ב, ומן הדברים שלו ניתן להבין, שיש לו נסיון רב בנושא הקומפוסטציה עצמה. הנה כמה מן הרעיונות:

* בדרך כלל עוברים בין 2 ל-4 חודשים כדי שערמת קומפוסט תהיה מוכנה. יש אפשרויות כדי לזרז את התהליך. למשל, לערבב דלי של קומפוסט הנמצא בשלב התחממות עם כל שלשה דליים של ערמת קומפוסט חדשה. באופן זה, הקומפוסט שכבר התחיל להתחמם משמש כתרבית התחל, המסוגל לגרום להאצת התחלת התהליך של קומפוסטציה.

* אם יש בעיה של מקום, אפשר לערם אומן (ערמה צרה, שטוחה וארוכה), בגובה אף אם טרם הסתיימה הבשלתו. תהליך הקומפוסטציה ימשיך בקצב מהיר, כך שעדיין ניתן יהיה להפוך את הערמה כנדרש.

* בכלל, יהיה זה מן החכמה, לערם את אומני הקומפוסט כאשר צפוי גשם חזק. באופן זה פחות שטח חשוף לגשם. עם שוך "המבול" שוב שוטחים את הקומפוסט באומנים.

* במקום לזרוק גרעינים מעופשים או תחמיץ מקולקל, אפשר להוסיף לערמת הקומפוסט. מצד שני, רצוי להימנע מהוספת שחת יבשה, קליפות עצים, ענפים או עלים, כי החומרים הללו דורשים זמן רב מדי להתפרקותם.

הגדרות "בעין בוחקת" – זה לא צחוק

ענוה – כשנותנים לאחרים לגלות, כמה אנחנו מוצלחים וחשובים.

רגשי נחיתות – יש רק לאנשים הלא-נכונים.

תהליך למידה – פשוט מסתכלים, מתבוננים.

ארכה, זמן לשם שיקול נוסף – נותנים לנקוף למספר ימים, לפני שנשארים באותה דעה.

השכלה כללית טובה – לדעת כמה שצריך.

קראנו בשבילכם...

Dairy Herd Management

רצוי להגביל הליכת החולבות

D.H.M. XII/97

יכול להיות, שעל פרוטיך ללכת מרחק רב מדי עד מכון החליבה, בפרט אלה שזה עתה המליטו. על פי המלצתו של ג'ון סמית, מדריך לגידול בקר באוניברסיטת קנזאס, ארה"ב יש להגביל את מרחק ההליכה מאזור הרביצה (תאירביצה) עד השער לחצר ההמתנה לכ-330 מטר, בכיוון אחד, לפרות שנחלבות פעמיים ביממה. עבור אלה שנחלבות שלוש פעמים ביממה יש להגביל את מרחק ההליכה לכ-210 מטר לכל כיוון, ול-150 מטר בכיוון אחד לנחלבות 4 פעמים ביממה.

בנוסף לכך, יש לשכן את הפרות שבראשית תחלובתן קרוב ככל האפשר למכון החליבה, כי ממילא הן נמצאות תחת תחת אכף חזק למדי.