

למה כל כך קשה לגלות פרות בהתייחסותן?

20 ל-55 פעמים במשך הייחוס". המחברים צפו רק 8.5 עמידות בממוצע בייחוס. * המיתוס השלישי – "הפרות מתייחסות בעיקר בלילה". המחברים מצאו שהפרות מתחילות להתייחס בכל שעות היממה.

המחברים ממליצים ליצור ברפת תנאים אופטימליים העשויים להקל על הפרות להראות את סימני הייחוס השונים. אותם סימנים מתגלים ביתר קלות ובהירות, ככל שלפרות אפשרויות נוחות ליצור מגע האחת עם זולתה; לצורך זה חשוב למנוע צפיפות יתר באזור מחייתן של הפרות ויש לדאוג לתשתית נוחה ובטוחה למדרך הפרות – לא בוך טובעני ורצוי גם לא בטון חלקלק: רצפה קשה מבטון (או אף לבנים) אפשרית כל עוד היא מחורצת. מעבר לכל אלה מומלץ לבצע תצפיות תכופות ושימוש באמצעי עזר לגילוי ייחוסים.

הביא לתשומת לבנו: פרופ' אליעזר אייזנבד.

בחוברת הווארד'ז דיירימן, 25.10.00 הופיע מאמרם של החוקרים פרופ' ריי גבל ועמיתו קולין מורי מן ה-Virginia Tech Dairy Cattle Center: "מדוע כל כך קשה לגלות פרה בייחוס?" המחברים עונים על השאלה תוך שלילת שלשה "מיתוסים" הרווחים בין הרפתנים:

* מיתוס ראשון – "הפרות נמצאות בייחוס עמידה במשך 12 עד 18 שעות. המחברים מצאו שלמעשה פרות הולשטיין עומדות במשך הייחוס בממוצע רק 7 שעות ופרות ג'רזי 8.3 שעות.

מכיר שעוד בשנת 1976 איתמר ושינדלר מצאו שמשך ייחוס העמידה בפרות שלנו הוא 11.8 שעות, ופולמן וחוב' 10.6 שעות (1978). נתונים אלה קרובים יותר לממצאי החוקרים האמריקאים המצוטטים כאן מאשר לנתוני המיתוס. יתכן שגם אצלנו היום משך ייחוס העמידה התקצר עוד במקצת במשך השנים.

* מיתוס שני – "פרות נקפצות עומדות בין

מערכת ה-Heatime לזיהוי דרישות מבית 0.0A.

תעקוב ותמדוד את פעילות הפרה בכל שעות היממה, ותדווח לך מתי בדיוק המועד להזרע.

Heatime

- אין צורך במחשב על מנת לאתר את הפרות הדורשות.
- חיווי מיידי במכון החליבה על פעילות הפרות.
- המערכת פשוטה וידידותית להפעלה.
- חיסכון ניכר בשעות עבודה.

בעזרת ה-Heatime נוכיח לך שאפשר לסמוך לא רק על תצפיות ובהשקעה כספית לא גבוהה תוכל להגדיל את הרווחיות מעדר החולבות.

ת.ד. 564, נתניה מיקוד 42104 טל: 09-8652050 (רב קווי) פקס: 09-8650703
WWW.SERCO.IL

