



סיוע בהמלטה קשה על קצה המזלג...




שולמית זוננברג* – וטרינרית, מרצה, ורכזת חוג במכללה הטכנולוגית רופין

גם המופיע בקריקטורה 1 לא יעשה. כוון המשיכה של שני המסיעים חייב להיות אחיד. המשיכה חייבת להתקיים עם צירי הפרה ועם הקשת שאותה היא יוצרת בגבה. גם כשהפרה רובצת על צדה ומסייעים בעדה, המשיכה חייבת להיות בזמן הצירים ולא בהפוגות ביניהם, וביחד עם קשת גבה.

בציור 1 צרו קו דמיוני, מאגן הוולד, דרך אגן האם ותמשיכו אותו כקשת עד לגובה העקבים של הפרה. יוצר לכם חצי מעגל. דרך חצי מעגל זה אתם חייבים להוביל את הוולד החוצה מעדנות.


**Pull through an arc.
Avoid excessive force!**



ציור 1

איך עושים זאת ומה הכוונות שאתם חייבים לעבוד כאשר מסייעים, בין אם הפרה שוכבת או עומדת:


- (1) משכו מעלה בזווית לשורש הזנב האמהי כאשר העובר בתחתית בטן האם.
- (2) משכו ישר בהמשך לעמוד השדרה האמהי כאשר עמוד השדרה העוברי מקביל לעמוד השדרה האמהי (ראו קריקטורה 2).
- (3) משכו לכוון גפי האם כאשר רוב העובר מחוץ לאם.



קריקטורה 2



תמונה 1



קריקטורה 1

* בימים אלו יוצא לאור ספר הביכורים שלי – "האיכר מכפר פסגה". זהו רומן אהבה המשתרע על פני השנים 1908-2008 כשבקע שלו הרבה רפת, פרות ורפתנים.





במזון, אנחנו המרכז! מרכז מזון נהלל



שירות | איכות | אמינות

שנת שלום וברכה לכל רפתני ישראל



מרכז מזון נהלל בע"מ
נהלל 10600, engeluzi@gmail.com
טל. 04-8112452 פקס. 04-8112403

חובות נוספות עלינו כמילדים:

- (1) נקו את אחורי הפרה, אזור פי הטבעת והבושת, עם סבון, מים ומברשת, לפני שתכניסו יד נקייה על מנת לסייע.
- (2) יש להחזיר יד ולסייע בהמלטה עם חומר סיכה, החומר המועדף הוא זולין. הוא זול, לא יוצר ריאקציות עם הרקמות ואינו נשפך ומתבזבז. אין לסייע ללא חומר סיכה. יש למשוך את החומר על שפתי הבושת, הנרתיק, צוואר הרחם הפתוח והמחוק, ועל העובר עצמו.
- (3) אין למשוך את הוולד בשום אופן החוצה טרם תיקנו תנוחה. המצג שלעינינו חייב להיות ראש ושתי גפיים קדמיות, או זנב ושתי גפיים אחוריות ובשני המקרים הוולד על בטנו.
- (4) משכו רגל אחת מעט קדמית לרגל השנייה, זאת ע"מ להצר את רוחב הכתפיים או את רוחב האגן העוברי ביחס לאגן האימהי.
- (5) בתום שלב 2 להמלטה, באם הפרה ממליטה בעמידה, תמכו בוולד בדרכו לקרקע אל תתנו לו ליפול.
- (6) זכרו: כוח הדחיפה של האם הוא כ-70 ק"ג ואילו כוח המשיכה של מכשיר ההמלטה הוא גדול (400 ק"ג) ויש לעבוד עמו בעדינות.
- (7) הקדישו לניסיונות הסיוע 10 דקות בלבד ואם זה "לא עובד" (למשל אם לא ניתן לתקן תנוחה של ראש ולד שמונח אחורה או הצידה) צלצלו לוטרניר והמתינו בסבלנות.
- (8) במידה והעגל עצום כפי שמופיע בתמונה הראשונה, הניחו לפרה והמתינו לוטרניר, גם אם זה ייקח כמה שעות, אל תחברו את הפרה לשער, או מנוף דומה אחר, אם חשוב לנו לעשות משהו, אפשר להעלות את הפרה על אנטיביוטיקה רחבת טווח ומשככי כאבים, ולהוסיף עוד בקבוק קלציום תת עורי. זה יועיל מאד, במידה ויהיה צורך בניחוח קיסרי או באמבריטומיה.
- (9) פרה עם עצירת שליה היא פרה בהמלטה ויש להתייחס אליה בהתאם. כלומר בשימת לב, בעדינות, ברגישות ובסבלנות. אבל כך יש להתייחס לכל פרה הלא כן? ■

