

פרוצדורות כואבות בעגלים

ד"ר גלעד פקטור החקלאית

ישנן מספר פעולות ממשקיות הנעשות בעגלים שהן כואבות. מטבע הדברים, עלינו לנסות ולצמצם את הכאב הנגרם עקב פעולות אלה, על מנת לצמצם את הפגיעה ברווחת בעלי החיים •

מה הן הפרוצדורות שייסקרו במאמר זה?


- הסרת קרניים
- סימון באמצעות כוויות
- הסרת פטמה עודפת
- קטימת זנב

הסרת קרניים

יש להבחין בין הסרת ניצן הקרן שזהו תהליך הנעשה עד גיל 8 שבועות, לבין הסרת קרניים המחוברות לגולגולת הנעשית אחרי גיל 8 שבועות. תמיד יש להעדיף לבצע הסרה של ניצן הקרן שאיננה מחוברת לגולגולת וגורמת לפחות כאב ונזקים.

עם זאת, גם עד גיל 8 שבועות הסרת ניצן הקרן היא תהליך כואב. ניתן לבצע את הסרת ניצן הקרן בשתי דרכים עיקריות: עם מלחם הצורב את ניצן הקרן (צריבה בחום) או באמצעות משחה (צריבה כימית). שתי הדרכים כואבות. הצריבה בחום כואבת יותר בזמן הצריבה עצמה, אך בשל צריבת קצות העצבים נמנע כאב מתמשך לאורך שעות וימים. הצריבה הכימית לעומת זאת איננה צורבת את קצות העצבים ולכן יוצרת כאב מתמשך. בין אם בוחרים לבצע צריבה בחום או צריבה כימית, חובה על פי חוק לבצע הרדמה מקומית החל מגיל 10 ימים. ההמלצה שלי היא לבצע הרדמה מקומית בכל גיל על מנת לצמצם את הכאב בעת ביצוע הצריבה. מעבר לביצוע הרדמה מקומית מומלץ לבצע טיפול בנוגד דלקת על מנת לנטרל כאב מתמשך של ההסרה. החומר המומלץ לשימוש הוא לוקסיקום. לוקסיקום הוא נוגד דלקת המתאים לשימוש גם בעגלים צעירים ויתרוננו בכך שהוא ניתן פעם אחת ומשך זמן הפעולה שלו ארוך (מספר ימים). בנוסף לביצוע הרדמה מקומית וטיפול עם נוגד דלקת, מומלץ, לפחות בעת שימוש במלחם לטשטש את העגל. כך, העגל שוכב רגוע ואיננו סובל מעקה משמעותית. כמו כן, הטשטוש מאפשר לעבוד בצורה מסודרת ונקייה ומבלי לגרום לנזקים.

בבקר לחלב מותר לבצע רק כוויות קור. את כוויות הקור רצוי לבצע בגיל של שלושה חודשים, ולא מיד עם הגמילה



בחנית סממני כאב ועקה בעת ולאחר סימון בחום, בקור ובדמה

עם אפקט מתמשך למספר ימים. גם קרפריב (קרפרופן) ניתן חד פעמי ויש לו אפקט מתמשך של שלושה ימים ולכן הוא מתאים כנוגד דלקת.

הסרת פטמה עודפת

יש ויכוח לגבי נחיצותה של הפרוצדורה הזו. בכל מקרה, אם נעשית יש לבצעה מוקדם ככל האפשר. ממליץ לבצע הרדמה מקומית של איזור החיתוך עם אדרנאקאין בצורה מעגלית סביב הפטמה.

קטימת זנב

פרוצדורה זו נאסרה בשנת 2003 לפי הנחיות מנהל השירותים

סימון באמצעות כוויות

בבקר לחלב מותר לבצע רק כוויות קור. את כוויות הקור רצוי לבצע בגיל של שלושה חודשים, ולא מיד עם הגמילה. בעת גמילה בעל החיים בין כה נמצא בעקה והוספת עוד גורם עקה רק מחלישה את מערכת החיסון שלו עוד יותר. כוויות הקור גורמות לכאב לאחר שאזור הכוויה מפשיר. בעת ביצוע הכוויה ניתן לראות עקה משמעותית (עליה בהורמוני עקה) הנובעת מעצם הריסון. ההמלצה להפחתת כאב בעת ביצוע כוויה היא על ידי מתן נוגד דלקת כגון לוקסיקום. לא ניתן לבצע הרדמה מקומית לאזור כה נרחב עליו נעשית הכוויה. מתן נוגד דלקת ינטרל כאב מתמשך בעת ההפשרה. ניתן להשתמש בפינדין או קטופרוסול, אך היתרון של לוקסיקום הוא מתן חד פעמי



חיימזון
החזקות בע"מ

צי רכב ייעודי חדש ומתקדם הכולל נגררים מסוגים שונים לכל מטרה

יש מובילים.... ויש מובילים בתחום!!!

ניסיון של למעלה מ-40 שנה בענף ההובלה

- * רכבי משא שובנו עם ארמזים בנפחים גדולים מאוד להובלת כללים / גרעינים / תומצרים ועוד תומרים נפחיים
- * הובלות תוצרת חקלאית מכל סוג וכלל יעד: מחייש / מחסני הפואנים / תמלי ישראל עם כל סוגי המשאיות: הייבנים - ומסות - סמיטריילרים - מדר לוביטריילר
- * הובלה במיכליות שואבות של נוזלים
- * הובלות חציר עם מתמכים וחישים בשוק
- * הובלות בקר עם טריילרים וחישים ומתקדמים

אשמח לגייס גם אתכם למערך ההובלה שלנו!
 חן חיימזון 050-8870015 henhaimzon@gamil.com

חיימזון החזקות בע"מ - מובילים הצלחות
 ת.ד. 1084 קרית מלאכי 8311001 | 08-8503211 | haimzonoffice@gmail.com | www.haimzon.co.il

נהגים מקצועיים ותיקים ובעלי ניסיון עשיר



הנחיות השירותים הווטרינריים בישראל

הפעולה	איסור	תנאים להיתר
סימון בקר בכווייה קרה	מותר	א. למטרות ממשקיות בלבד ב. באמצעים מקובלים בלבד
סימון בקר בכווייה חמה	מותר	א. אך ורק לסימון סמל המשק לו משתייך הבקר ב. ביצוע בגיל שמתחת לחצי שנה ג. מקסימום שני סימנים ד. גודל כווית החום בעת ביצועה (גם גודל משותף של שני סימנים) לא יעבור גודל 15X15 ס"מ. ה. ט. מומלץ לא לבצע הסימון בקיץ.
הסרת קרניים (בקר וצאן)	מותרת	א. משיקולים ממשקיים בלבד. ב. כל הורדת קרניים מעבר ל-10 ימים מחייבת הרדמה מקומית אשר תבוצע על ידי רופא וטרינר.
הסרת קרניים (בקר וצאן)	מותרת	ג. הפעולה תבוצע בעזרת אמבריוטום או מסור תוך השארת 5 ס"מ לפחות מבסיס הגולגולת
הסרת ניצני קרניים בבקר על ידי משחה- (צריבה כימית)	מותרת	ב. לאחר גיל 10 ימים הפעולה תבוצע בהרדמה בלבד.
הסרת פטמה עודפת	מותרת	על ידי רופא וטרינר בלבד
קטימת זנב (בקר)	אסורה	

הווטרינריים. אין בה שום תועלת. מחקרים הראו שאין בצידה כאב רב כשהיא נעשית בגיל צעיר, אך כאמור, מאחר ואין תועלת בצידה פרוצדורה זו נאסרה.

סיכום

פעולות הגורמות כאב צריכות להיעשות תוך מזעור כאב וסבל על פי הנחיות השירותים הווטרינריים והמידע העדכני בספרות.

▲ אין לבצע פעולות בלא שיש מהן תועלת! ▲

האחוה בין האדם והבהמה
מובילה את היצור האנושי
אל מעבר לגבולות בני מינו,
ומגשימה את האחדות עם כל
החי בעולם" מהאטמה גנדי