

# הדבקה בברוצלה והלך המחלה

משרד החקלאות פרסם לאחרונה מידע חשוב בנושא ההדבקה ממחלת הברוצלה  
וזאת עקב התפרצותה בחודשים האחרונים •



7. טיפול בחלב צאן כנגד אפטות בפה בילדים.
8. החיידק שורד במוצרי חלב לא מפוסטרים (השומן שומר עליו): בחלב חמוץ בטמפ' חדר 1-4 ימים. חלב תקין מקורר 10-44 ימים, שמנת מקוררת 24-64 ימים, גבינות קשות 14-44 ימים. ▲

עזים כבשים וכלבים נדבקים על ידי אכילת מזונות שזוהמו בחיידק הברוצלה: שליות נפלים, הפרשות וגינליות.  
1. החיידק חודר דרך הפה, מתרבה בגוף ועובר לבלוטות הלימפה, עטינים (זיהום החלב בחיידק) ורחם, הפלות מתרחשות בסוף ההיריון.  
2. בזכרים דלקות באשכים.  
3. פגיעה בבעלי חיים המתבטאת באובדן פוריות (הפלות בנקבות).

## גורמי סיכון לאדם

1. שתייה של חלב נגוע שלא פוסטר (הליך הפסטור הורג את החיידק).
2. טיפול ומגע בבעלי חיים, בעיקר בעת סיוע בהמלטה.
3. הבשר עצמו נקי מהחיידק, בשחיטה מגע עם החלב מזהם את הבשר. לכן בשר טרי מסוכן יותר מבשר משומר / מבושל (בהם החיידק לא שורד).
5. העברה מאדם לאדם נדירה.
6. הכנה ועיבוד מוצרי חלב (גבינות, יוגורטים, מוצרי קוסמטיקה מחלב ועוד) - מקור להדבקה.

## פינוי וכילוי פסולת מן החי



א.ע. ביו אקולוגיה בע"מ  
מתקן ארצי לפינוי וכילוי פסולת מן החי

- המתקן מפנה ומכלה את כל פגרי הבקר מרפתות החלב, מפטמות מרעה, מבתי חולים וטרינריים ומבתי המטבחיים.
- החברה אחראית על פינוי וטיפול בפגרים בהתאם לתקנות השירותים הוטרינריים.
- מערכת איסוף הפגרים הארצית מאפשרת לכל היצרנים בארץ להנות מהשירות, בכך נמנע הצורך של המגדל לדאוג לפינוי הפגר.
- איסוף וכילוי הפגרים תורם הן במישור האקולוגי והן בצבירת מאגר מידע בכל הקשור למחלות בעלי חיים.



חדש! למכירה כלוב נייד לאצירת פגרים. מותאם לדרישות השירותים הוטרינריים. גודל 2.5 x 2 גובה 1.5

טל. 04-9069500 פקס. 04-9069510  
email: info@bioecology.co.il