

מדרכת ישראל / משרד החקלאות
מנהל חשרותים הוטרינריים ובריאות המקנה, בית דגן

ח' תשרי התש"נא
27 ספט. 1990

הודעה לרפתנים ולבוקרים

מדתח ליקיונית בבקר

א. מחלה זו, הנקראת גם "מחלת שלשת חימים" (BOVINE EPHEMERAL FEVER), אובחנה עתה במספר רפתות בבקעת כנרת, עמק הירדן ועמק בית שאן. המחלה נחשבה כאנדמית באזור ואובחנה בא"י מספר פעמים, בפעם האחרונה בשנת 1951. כל החתמצויות בעבר ארעו בחדשי הסתיו.

ב. המחלה נגרמת ע"י נגיף המועבר ע"י חרקים מעופפים מוצצי-דם. אין הדבקה ישירה, אך ניתן להפיץ את הנגיף גם באמצעים מכניים, כגון מזרקים.

ג. המחלה מתבטאת בעליית חום קצרה, **בבוצה**, חוסר תיאבון, הפרשות מהפה והאף, דימוע וירידה בתחלובה. בדרך כלל היא חולפת מאליה תוך יומיים-שלושה, אף כי הפרות עולות להראות סימני חולשה, ולעתים גם צלועח ורעד-שרירים, במשך מספר ימים נוספים. הפגיעה קשה יותר בפרות גבוהות משקל. אחוז התחלואה עלול להגיע לעשרות; התמותה בד"כ, מתחת ל-1%. תיתכנה הפרות.

ד. על המשקים הנגועים חוטלו הגבכות תנועה אך המחלה עלולה להמשיך ולחתפשט באמצעות חרקים הנישאים ברוח.

ה. להקטנת סכנת ההדבקה, מומלץ לרסס את הבקר בכל צפון חארץ, עד לסוף נובמבר השנה, על פי החמצות המצורפות אשר חוכנו ע"י האגף לעזיטולוגיה במכון הוטרינרי. כמו כן מומלץ לטפל במקומות הדגירה של יתושים.

ו. על כל מקרה חשוד יש להודיע מיד לרופא הוטרינר המטפל וללשכת הוטרינרית המחוזית.

בברכת גמל חתימה טובה,

ד"ר א. שמשוני

מנהל חשרותים הוטרינריים

חמצות לריסוס בתר במני חרקים מעופפים מעבירי מחלות

1. למחול את התרכיז המוחלב בהתאם להוראה בתווית (מיחול אחד למאתיים בתכשירים מס' 1-8; מיחול אווד לארבע מאות בתכשיר מס' 9).
 2. לרסס את הבקר היטב בכמות תריסס מוכן בין 500 ל-1000 מ"ל כהתאם לגודל בעל-החייט.
 3. לרסס את הבקר פעמיים בשבוע עד שתחלוף הסכנה.
- כשימת תכשירים מורשים

מס'	שם וזתכשיר	שם החברה	חומר פעיל
1	סומקסין	יבנין ויפה	פרמתרין
2	סטומוקסין	תפזול	"
3	פיריקסין	תפזול	"
4	אלוקסין	יבנין ויפה	"
5	אלמוקסין סופר	כ.צ.ט.	"
6	אלמוקסין 20	כ.צ.ט.	"
7	פטרול 20 לבקר	קדם כימיקלים	"
8	פירולין	יבנין ויפה	"
9	סילופליי	תפזול	סידותרין